

# Digiscoping

## Pequenas Jóias da Região Sudeste do Brasil



Beija-flor-preto (*Florisuga fusca*)

Carlos Henrique



Topetinho-vermelho (*Lophornis magnificus*)

Carlos Henrique



Beija-flor-de-peito-azul (*Amazilia lactea*)

Carlos Henrique



Beija-flor-de-orelha-violeta (*Colibri serrirostris*)

Carlos Henrique



Beija-flor-rubi (*Clytolaema rubricauda*)

Carlos Henrique

A região sudeste do Brasil é rica em espécies de beija-flores, possui perto de quarenta espécies. A família Trochilidae é exclusiva das Américas e possui um total aproximado de trezentos e trinta espécies. A maior quantidade de espécies está concentrada nos países andinos, Equador e Colômbia.

Algumas destas aves multicoloridas e iridescentes são tão pequenas e quando não é dado a elas a devida atenção, podem passar por despercebidas. Isso me faz lembrar da primeira vez em que observei o estrelinha-ametista (*Calliphlox amethystina*). Eu estava com outros amigos fotografando aves e seguindo um riacho dentro da mata, abruptamente saímos para o aberto e tive de semicerrar os olhos devido a claridade. Então, tive a impressão de ver algo muito pequeno voando por perto. Não dei muita atenção, pois parecia um inseto. E foi o zum-zum diferente que chamou a minha atenção, parecia vir de um inseto, como um besouro. Quando o beija-flor pousou num galho fino e seco a um metro e meio de distância, foi difícil de acreditar que aquele ser diminuto era um estrelinha-ametista. Estava ali com a cauda aberta, fazendo várias poses para fotos. Depois voou, um vôo lento e com a cauda empenada para trás. Foi de flor em flor para o alto até desaparecer.

Interessante são as “arenas” criadas por machos do beija-flor-de-topete (*Stephanoxis lalandi*) na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, onde eles disputam as fêmeas no canto e voando de um lado para o outro durante a época de reprodução.

Os beija-flores-tesoura (*Eupetomena macroura*) são territorialistas, não deixam que outros semelhantes, beija-flor ou qualquer ave que seja se aproxime do arbusto em flor ou do bebedouro onde eles são os donos do pedaço. Outro dia em Santo André, Paranapiacaba, pude observar três indivíduos do beija-flor-preto (*Florisuga fusca*) enganando o beija-flor-tesoura, enquanto ele perseguia um, os outros dois tiravam proveito do bebedouro.

Espécies florestais como o rabo-branco-de-garganta-rajada (*Phaethornis eurynome*) usam o display da cauda em leque e o bico aberto mostrando o lado interno de cor amarela para atrair as fêmeas.

Para ver mais fotos de beija-flores, visite o website: [www.carduelis.bio.br](http://www.carduelis.bio.br).

**Carlos Henrique L. N. Almeida**  
*Guia de Observação de Aves*



Beija-flor-de-frente-violeta (*Thalurania glaucopis*)

Carlos Henrique



Topetinho-verde (*Lophornis chalybeus*)

Carlos Henrique



Beija-flor-de-topete (*Stephanoxis lalandi*)

Carlos Henrique



Rabo-branco-de-garganta-rajada (*Phaethornis eurynome*) Display

Carlos Henrique



Beija-flor-dourado (*Hylocharis chrysura*)

Carlos Henrique