

# Ampliação da distribuição de *Aegolius harrisii* a partir de coleta por atropelamento



Raphael Eduardo Fernandes Santos

O caburé-acanelado (*Aegolius harrisii*) é uma das corujas menos conhecidas do Brasil, sendo citada para poucas localidades em território nacional. No estado do Paraná, os registros de sua ocorrência concentram-se no terço superior da bacia do rio Iguaçu, nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais e Mandirituba (SCHERER-NETO & STRAUBE, 1995; RIBAS & SANTOS, 2007, STRAUBE *et al.*, no prelo).

No dia 10 de dezembro de 2008 um indivíduo foi encontrado morto, vítima de atropelamento, na BR-280, município de General Carneiro, estado do Paraná - BR, próximo à divisa com o município de Palmas (26°32'S e 51°24'W, 1100 m s.n.m.). Este registro amplia ao sul e a oeste a área de distribuição de *A. harrisii* no Paraná. A ave foi encaminhada para o Museu de História Natural Capão da Imbuia e atualmente faz parte do acervo da coleção ornitológica da referida instituição.

Até então, excetuando-se a coleta efetuada no Parque Estadual João Paulo II, localizado na área urbana de Curitiba, todos os registros da espécie no Estado foram obtidos em locais caracterizados pela Floresta Ombrófila Mista Aluvial, com predomínio de branquilha (*Sebastiania commersoniana*). Esse ambiente trata-se de uma formação ribeirinha sujeita a inundações periódicas, constituindo as florestas ripárias que ocupam terrenos situados junto aos cursos d'água (PIRES *et al.*, 2005). Caracteriza-se estruturalmente por uma elevada densidade de plantas de médio e pequeno porte, com o dossel entre 10 e 15 m, variando desde associações quase homogêneas, onde o branquilha é a espécie dominante, até associações mais evoluídas, onde a ele se juntam a corticeira (*Erythrina falcata*), o tarumã (*Vitex megapotamica*), a aroeira (*Schinus terebinthifolius*), o vacum (*Allophylus edulis*), o açoita-cavalo (*Luehea divaricata*), a maria-mole (*Symplocos uniflora*), a murta (*Blepharocalyx salicifolius*) e o jerivá (*Syagrus romanzoffiana*). O sub-bosque desta formação é geralmente caracterizado pela presença do cambuizinho (*Myrciaria tenella*), do guamirim-ferro (*Calyptanthes concinna*) e também da embira (*Daphnopsis ra-*



Fig. 1: *Aegolius harrisii* atropelado na BR-280, bem próximo à divisa com o estado de Santa Catarina. Foto: Raphael E. F. Santos




Fig. 2: Vista ventral do indivíduo coletado. Foto: Raphael E. F. Santos



**Figs. 3 e 4: Ambiente em que a ave foi encontrada, bastante diferente do conhecido anteriormente para a espécie em território paranaense. Um talhão de *Pinus* existe em um dos lados da estrada, enfatizando a possível relação de *A. harrisii* com esta árvore exótica. Fotos: Raphael E. F. Santos**

*cemos*) (KLEIN e HATSCHBACH, 1962; LEITE e KLEIN, 1990; IBGE, 1992; RODERJAN *et al.*, 2002; PIRES *et al.*, 2005; BLUM, 2008).

O presente registro foi obtido em ambiente distinto, confirmando sua ocorrência em área de Floresta Ombrófila Mista Alto-montana do extremo sul do Paraná. As informações disponíveis até o momento apontam a ocorrência da espécie apenas para o Primeiro Planalto Paranaense, sendo esta a primeira constatação no Terceiro Planalto. Segundo o Atlas geomorfológico do estado do Paraná, a região está inserida no Planalto de Clevelândia, com altitudes variando entre 720 e 1320 m s.n.m. O local de registro apresenta floresta secundária em estágio intermediário da sucessão de um lado da rodovia e um povoamento de *Pinus* sp. com aproximadamente oito metros de altura no lado oposto. O atropelamento indica que o indivíduo estava se deslocando entre estas duas formações florestais. Uma provável correlação entre a espécie e áreas de cultivo desta árvore exótica já foi observada anteriormente (RIBAS & SANTOS, 2007) e pode ser reforçada pelos dados do presente manuscrito. Esta possível associação necessita de mais estudos para uma avaliação precisa sobre a utilização desta conífera pelo caburé-acanelado em território brasileiro.



**Fig. 5: Mapa de localização do local de registro do caburé-acanelado (*A. harrisii*) no extremo sul do estado do Paraná - BR, entre os municípios de General Carneiro e Palmas**

## Referências

- BLUM, C. T.; SAMPAIO, A. C. F. Flora. In: SOCIEDADE CHAUÁ. **Plano de Gestão Sítio Imbituva**. Fernandes Pinheiro: Sociedade Chauá/ SPVS, relatório técnico, 2008.
- IBGE. **Manual Técnico da Vegetação Brasileira**. Rio de Janeiro. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - DERNA (Manuais Técnicos de Geociências n. 1), 1992. 92 p.
- KLEIN, R. M.; HATSCHBACH, G. Fitofisionomia e notas sobre a vegetação para acompanhar a planta fitogeográfica do município de Curitiba e arredores (Paraná). **Bol. Univ. Fed. Paraná** (Geogr. Física) 4: 1-30, 1962.
- LEITE, P.; KLEIN, R. M. Vegetação. In: IBGE. **Geografia do Brasil: região Sul**. v. 2. Rio de Janeiro. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. p. 113-150, 1990.
- MINEROPAR – Minerais do Paraná S/A. **Atlas Geomorfológico do Paraná**. Escala 1:250.000. Curitiba: Mineropar/ UFPR, 2006. 63 p.
- STRAUBE, F. C.; URBEN-FILHO, A.; KAJIWARA, D. Aves. In: MIKICH, S. B. & BÉRNILS, R. S. (eds.) **Livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná**. R.S. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná, 2004.

- PIRES, P. T. L.; ZILLI, A. L.; BLUM, C. T. (Coord.). **Atlas da Floresta Atlântica no Paraná – Área de abrangência do Programa Proteção da Floresta Atlântica**. Curitiba: SEMA/Programa Proteção da Floresta Atlântica – Pró-Atlântica, 2005. 104 p.
- RIBAS, C. F.; SANTOS, R. E. F. Novo registro documentado do caburé-acanelado *Aegolius harrisii* iheringi (Sharpe, 1899) para o estado do Paraná. **Atualidades Ornitológicas** n.140, p.4-5, 2007.
- RODERJAN, C. V.; GALVÃO, F.; KUNIYOSHI, Y. S.; HATSCHBACH, G. G. As Unidades Fitogeográficas do Estado do Paraná. In: **Ciência & Meio Ambiente – Fitogeografia do Sul da América**. Santa Maria (RS): Universidade Federal de Santa Maria, n. 24, p.75-92, 2002.
- SCHERER-NETO, P.; STRAUBE, F. C. **Aves do Paraná: (história, lista anotada e bibliografia)**. Curitiba: Ed. dos autores. 1995.
- STRAUBE, F. C.; CARRANO, C.; SANTOS, R. E. F.; SCHERER-NETO, P.; RIBAS, C. F.; MEIJER, A. de; VALLEJOS, M. A. V.; LANZER, M.; KLEMANN-JR., L.; AURÉLIO-SILVA, M.; URBEN-FILHO, A.; ARZUA, M.; LIMA, A. M. X.; SOBÂNIA, R. L. M.; DECONTO, L. R.; BISPO, A. A. O.; JESUS, S. de; ABILHOA, V. **Coletânea da Avifauna de Curitiba (Paraná, Brasil)**. No prelo.

Bio situ Projetos e Estudos Ambientais Ltda.  
Rua Carlos Belão, 45 - Centro - Piraquara, Paraná.  
CEP: 83.306-120. E-mail: [raphael@biositu.com.br](mailto:raphael@biositu.com.br)