

Registros documentados de *Hymenops perspicillatus*

(Tyrannidae) para o Estado de São Paulo - BR

ISSN 1981-8874



Bruno Lima¹

Hymenops perspicillatus é um pássaro dos banhados, brejos, juncais e taboais litorâneos do Rio Grande do Sul. Também é encontrado de Santa Catarina até o Rio de Janeiro e no oeste do Mato Grosso (SIGRIST, 2006)

O primeiro registro documentado desta espécie no Estado de São Paulo é citado em Willis & Oniki (1985), onde um exemplar foi coletado na Fazenda Floresta, na várzea do Rio Ribeira em Iguape, em 11 de Agosto de 1977.

Este exemplar foi depositado na Coleção Zoológica de Referência da Seção de Vírus Transmitidos por Artrópodos, do Instituto Adolpho Lutz, em São Paulo-SP.

Luis Eloí, coordenados desta coleção, nos confirmou esta coleta, informando que o exemplar trata-se de uma fêmea, cujo número de tombo é: AN-56459. Segundo ele, este exemplar foi coletado por Valdevino Elias.

Na literatura, são citadas duas visualizações desta espécie, mas sem registro fotográfico: uma em 1992, no Horto Florestal da Serra da Cantareira, em São Paulo-SP (GRAHAN, 1992), onde um macho foi avistado. Trata-se no entanto, de um registro um tanto duvidoso, uma vez que a espécie em questão não foi visualizada pelo autor do referido trabalho, que apenas recebeu a informação de um funcionário, que diz ter visto um pássaro preto, de bico e anel perioftálmico amarelos, características também de *Platicycla flavipes* (sabiá-una), espécie comum na região.

Willis & Oniki (2003) também visualizaram esta espécie de 5 a 7 de setembro de 1996 em Pontal-SP.

Depois disso, registros documentados com fotografias foram feitos primeiramente por Olmos & Silva (2007) nos manguezais de Santos e Cubatão-SP, quando uma fêmea foi fotografada junto a uma poça de água em uma estrada de serviço, em área industrial (Foto 01), ao lado do Rio Piaçaguera (23°52'35"S, 46°23'41"W) nos dias 3 e 4 de setembro de 2006. Apanhava insetos em voo a partir do chão e da vegetação baixa, juntamente com um par de *Fluvicola nengeta*.

Depois em 11 de outubro de 2008, o ornitólogo Bruno Lima registrou esta espécie no município de Peruíbe-SP, bairro do Guaraú. Na presente ocasião, uma fêmea (Fotos 02 e 03) procurava alimento




Foto 1: Fêmea em Cubatão-SP. Autor: Robson Silva & Silva



Foto 2: Fêmea em Peruíbe-SP. Autor: Tim Hirsh

no solo em uma restinga arbustiva, entre a Praia do Guaraú e o Rio Garça Vermelha (24°22'25.45"S, 47°01'6.09"W).

Bruno Lima e Robson Silva e Silva também registraram esta espécie mais ao sul, na Ilha Comprida-SP, em 04 de dezembro de 2008 (Foto 04). Uma fêmea procurava alimento em uma vegetação arbustiva de restinga muito similar àquela encontrada em Peruíbe-SP, local do registro anterior.



Segundo Sick (1997), o macho é inconfundível: negro, com a região perioftálmica nua intumescida em forma de roseta enrugada amarelo-claro



Foto 3: Fêmea em Peruíbe-SP. Autor: Tim Hirsh



Foto 4: Indivíduo em Ilha Comprida-SP. Autor: Robson Silva & Silva

Agradecimentos:

Agradeço a ajuda dos ornitólogos: André de Luca, Carlos Gussoni, Fábio Olmos, José Fernando Pacheco, Luiz Fernando Figueiredo, Rafael Bessa, Robson Silva & Silva, Tatiana Pongillupi, além de Luiz Eloi do Instituto Adolpho Lutz, Tim Hirsh e dos revisores do AO (Atualidades Ornitológicas).

Referências

Grahan, D. J. (1992) The avifauna of the Serra da Cantareira, Paulo, Brazil: a preliminary survey. IF Série Registros (10):1-56

Sick, H. (1997) Ornitologia Brasileira. Editora Nova fronteira, Rio de Janeiro-RJ.

Sigrist, T. 2006. Aves do Brasil: uma visão artística. Fosfertil, São Paulo, SP.

Silva, R.S. & Olmos, F. Adendas e registros significativos para a avifauna dos manguezais de Santos e Cubatão, SP. (2007). Revista Brasileira de Ornitologia 15(4):551-650.

Willis, E. O. & Oniki, Y. (2003) Aves do Estado de São Paulo. Rio Claro: Divisa.

¹ www.atlanticforest.com.br