ATUALIDADES ORNITOLÓGICAS N.125, maio/junho de 2005 pág.10

COLETÂNEA DA AVIFAUNA DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO PARANÁ (BRASIL)

Fernando Costa Straube[1]
Ricardo Krul[2]
Eduardo Carrano[3]

1. *Mülleriana*: Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais. Rua Francisco Maravalhas, 171. Caixa Postal 1644. Curitiba/PR-Brasil. 80 011-970. E-mail: urutau@terra.com.br. 2. Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná. Avenida Beira-Mar, s/nº. Pontal do Paraná/PR- Brasil. 83255-800. E-mail: rkrul@cem.ufpr.br. 3. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Rua Imaculada Conceição, 1155. Curitiba/PR-Brasil. 80215-901. E-mail: e.carrano@pucpr.br

O Paraná pode ser considerado um dos estados brasileiros mais adiantados na pesquisa ornitológica, em especial no tocante a inventários e, por consequência, do conhecimento da distribuição das espécies (Hinkelmann & Fiebig, 2001). Entretanto, grande parte das informações encontram-se dispersas e inéditas na literatura, em museus e mesmo em arquivo pessoais dos pesquisadores, muitas vezes sem ter recebido a devida atenção para publicá-las.

Os grandes nomes da História Natural no Brasil século passado, pesquisadores viajantes que se deslocaram para esse País com o objetivo de estudar e coletar espécimens da fauna e flora locais, concentraram suas atividades na faixa litorânea, particularmente da região sudeste (Vanzolini, 1996). O Paraná, estado onde a pesquisa ornitológica despertou apenas no início do século passado, foi pouco privilegiado pela visita desses naturalistas; restaram, na maior parte, escassos relatos de expedições exploratórias sem cunho propriamente científico (Scherer-Neto & Straube, 1995; Straube & Scherer-Neto, 2001).

Historicamente, a porção sul do Paraná foi igualmente negligenciada, sendo que os únicos esforços nesse sentido devem ser creditados ao alemão Friedrich Sellow que, contrariando o percurso clássico de seus contemporâneos (*cf.* J.Natterer, A.Saint-Hilaire, G.Langsdorff), chegou a atingir pontos planálticos nunca antes explorados (Straube & Scherer-Neto, 2001). Não obstante, o legado valioso de Sellow acabou por ser lamentavelmente espoliado ou adulterado (Pacheco & Whitney, 2001), sendo-nos impossível resgatar, por enquanto, quaisquer informações colhidas em suas peregrinações ao interior do Paraná.

Foi apenas a partir do ano de 1910 que novos rumos tomaram as investigações ornitológicas nessa região, com a chegada, como imigrante colono, do naturalista Tadeusz Chrostowski, cognominado "Patrono da Ornitologia Paranaense" (Straube & Urben-Filho, 2002a). Anos depois, Chrostowski publicou seus resultados em um periódico da Sociedade Científica de Varsóvia (Chrostowski, 1912), relatando as descobertas e o percurso percorrido. Interessado na avifauna daquela região, retornou

em 1913 e depois, entre os anos de 1921 e 1924 junto com Tadeusz Jaczewski, na maior expedição ornitológica realizada em território paranaense (Chrostowski, 1921; Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926; Straube & Urben-Filho, 2002b; Wachowicz, 1994).

Poucos anos depois, cumprindo parte de uma grande expedição que percorreu quase todo o Brasil (Camargo, 1962), o alemão Emil Kaempfer visitou rapidamente a porção sul do Paraná. Contratado por Elsie Naumburg, do Museu Americano de História Natural, teve o resultado de suas coletas divulgado apenas em pequena parte (Naumburg, 1935, 1937 e 1940). Aparentemente, na coleção Kaempfer não consta nenhum espécime coletado na porção meridional paranaense e regiões limítrofes, embora ele ali tivesse visitado pelo menos duas localidades: Porto Almeida e Poço Preto, essa em Santa Catarina (Straube & Scherer-Neto, 2001).

Depois de tais iniciativas, outros viajantes naturalistas, encaminhados por suas instituições de origem estiveram coletando espécimes na área de transição entre a mata de araucária e a mata estacional. Um topônimo ali situado, acabou clássico como localidade de coleta: Cândido de Abreu, uma vez que fôra visitado por Chrostowski e, depois - já no fim da década de 20 por vários outros (p.ex. Arkady Fiedler, Edwin Steiger) (Hinkelmann & Fiebig, 2001; Straube & Scherer-Neto, 2001).

Já representando o início de uma preocupação local por estudos e coleções-testemunho de materiais científicos da fauna e flora do Paraná, surge o naturalista alemão Andreas Mayer, contratado pelo Museu Paranaense. Mayer obteve espécimens de todo o Paraná, bem como adjacências, durante as décadas de 40 e 60 e concentrou seu trabalho nas porções atlânticas, ocidentais extremas e meridionais do Estado. Lá colecionou um acervo de valor biológico incalculável, atualmente sob a guarda do Museu de História Natural Capão da Imbuia em Curitiba e em parte divulgado (Straube & Bornschein, 1989; Lorini & Persson, 1990; Bérnils & Moura-Leite, 1990; Wosiacki, 1990; Straube & Scherer-Neto, 2001). Mayer fez, ao total, cinco viagens para a região sul paranaense (julho de 1943 e abril de 1955), tendo colecionado significativamente em pelo menos cinco localidades, com especial destaque para os topônimos "Fazenda Estância Nova" e "Posto Indígena", ambos no município de Palmas e "Rio Jararaca, Santa Bárbara", atualmente em Bituruna (Lorini & Persson, 1990).

Devido a situações políticas desfavoráveis, as pesquisas zoológicas (inclusive ornitológicas) no Paraná sofreram uma séria estagnação e decadência, tão logo Mayer abandonou suas funções. Essa situação foi revertida apenas em meados de década de 70 quando Pedro Scherer-Neto, acompanhando as pesquisas da botânica Luiza T.Dombrowski, iniciou seus estudos pioneiros sobre a avifauna paranaense. Várias expedições foram organizadas na região meridional do Estado e, em algumas ocasiões acompanhadas por pesquisadores de outros estados brasileiros como Helmut Sick (Museu Nacional do Rio de Janeiro) e Jacques Vielliard (Unicamp, em Campinas) (Straube & Scherer-Neto, 2001).

O esforço para a consolidação da busca por informações, por fim, surgiu com a preparação do Relatório de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica de Segredo, um dos primeiros documentos desse tipo confeccionados no Brasil. Atividades subsequentes, intensificadas a partir da década de 80, permitiram a obtenção de dados sem precedentes no Estado do Paraná, não apenas pelo volume como pela continuidade. Além disso, favoreceram um conhecimento considerável da política ambiental local, associando-a às questões socio-econômicas e aos reflexos e consequências de obras de tal porte para a comunidade faunística regional (Agostinho & Gomes eds., 1997).

A partir de então, diversos pesquisadores realizaram estudos específicos ou de avifaunas em várias localidades daquela região, resultando em comunicações em encontros científicos nacionais e internacionais e mesmo em publicações em periódicos

especializados (Straube, 1988; Arruda & Péllico-Neto, 1990; Straube & Arruda, 1991; Arruda & Luçolli, 1991; Anjos & Bóçon, 1992; Krul, 1992; Bóçon, 1993; Straube & Reinert, 1993Pichorim & Bóçon, 1993, 1996; Krul & Moraes, 1994; Arruda *et al.*, 1995).

O presente estudo pretende ser uma compilação do conhecimento ornitológico acumulado há mais de uma década, enriquecido por informações históricas, colhidas por naturalistas e coletores atuantes nas décadas de 20 a 50 e de esforço pessoal do autores em campo.

MATERIAL E MÉTODOS

A.Área de estudo

A área de estudo situa-se entre latitudes de 24º30' e 26º45'S e longitudes de 50º45' e 52º30'W, em um intervalo altitudinal de 300 a 1000 m, às vezes excedendo a cota de 1200 m sobre o nível do mar (PARANÁ, 1987). A sua delimitação foi definida com a finalidade de representar a área nuclear da Mata de Araucária paranaense, incluindo as representações de campos naturais do planalto, nos chamados campos de Guarapuava e de Palmas (Maack, 1981). Uma pequena zona de transição com a floresta estacional foi incluída, com o propósito de permitir a articulação de cartas geográficas com o sistema proposto por Straube & Urben-Filho (2001). Nesse sentido, engloba maior parte do terço-médio da Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, bem como parte da região das nascentes dos rios Ivaí e Piquiri (figuras 1,2,3).

Situa-se no grande domínio da Mata Atlântica, com vegetação predominante da floresta ombrófila mista, com suas facies montana a alto-montana (Veloso *et al.*, 1991). Há notáveis representações de estepes (campos planálticos) nas porções de maior altitude, entremeados por capões de mata de araucária. A floresta aluvial (mata de galeria) que, ocorre com tanta representatividade no terço superior do Rio Iguaçu está ausente; ali, pelo contrário, ocorre uma interessante transição da floresta ombrófila mista com a floresta estacional semidecidual, que acompanha parte do vale fluvial do Rio Iguaçu e afluentes principais, aumentando suas dimensões em direção a oeste, à medida que o relevo torna-se mais plano e as médias térmicas anuais aumentam.

A área de estudo abrange dois tipos climáticos de Köppen, Cfa e Cfb, climas mesotérmicos subtropicais úmidos, esse com chuvas concentradas no verão e aquele com geadas severas frequentes (Maack, 1981). As médias térmicas anuais estão entre 14 e 19 ºC, menores nas áreas planálticas de maiores altitudes, tendendo a aumentar em direção a oeste, pelo vale do Rio Iguaçu; as médias distribuem-se entre 20 e 24 ºC no mês mais quente (fevereiro) e 10 e 15 ºC no mais frio (julho) (IAPAR, 1978).

A precipitação pluviométrica anual varia entre 1500 e 1800 mm, sendo o intervalo dezembro-fevereiro o trimestre mais chuvoso, com média de 300 a 600 mm e junho a agosto o mais seco, com 200 a 500 mm; por essas características, a pluviosidade pode ser considerada regionalmente mediana e com estações chuvosa ou seca pouco definidas (IAPAR, 1978).



Figura 1. O Paraná, com indicação das cidades mais importantes, estados vizinhos e, limitada em quadra mais escura, a área de estudo, correspondendo à região sul do Estado.

B. Métodos

Para a compilação, foram consideradas as espécies indicadas para a área de estudo (total: 3.357 registros de 388 espécies[1]) pela literatura ou espécimens por nós analisados e depositados nos acervos do Museu de História Natural Capão da Imbuia de Curitiba/PMC (MHNCI), Museu Nacional do Rio de Janeiro/UFRJ (MN), Museu da Usina Hidrelétrica de Segredo de Foz do Jordão, COPEL (MUHS). São incluídos os exemplares do *Field Museum of Natural History de Chicago*/EUA (FMNH) coletados por Edwin Steiger entre outubro e novembro de 1929 (*vide* Straube & Scherer-Neto, 2001), listados por D.Willard (*in litt.*, 2001). Também são adicionadas as espécies citadas por Rosário (1996) para as quadrículas que, embora situadas no estado de Santa Catarina, ficassem abrangidas pela malha cartográfica aqui considerada.

O trabalho de campo foi realizado individualmente pelos autores e demais colaboradores em 57 campanhas visando a observação e coleta de espécimes, somando um total aproximado de 2887 horas de esforço amostral. As localidades visitadas, bem como informações toponímicas adicionais, encontram-se apresentadas no anexo 1.

[1] Excluídas as espécies registradas nas adjacências do estado de Santa Catarina (Rosário, 1996) porém não constatadas nos limites do território do Paraná (n=7).

Figura 2. Área de estudo em imagem de satélite, indicando destacadamente o rio Iguaçu e seus diversos reservatórios de usinas hidrelétricas, bem como a orografia ondulada da região e alguns extensos maciços florestados, entremeados por campos (Fonte: Miranda & Coutinho, 2004).

Para os trabalhos de campo utilizou-se as técnicas convencionais em estudos ornitológicos qualitativos: reconhecimento visual com auxílio de binóculos, identificação de vocalizações e captura por meio de redes-neblina (*mist nets*) ou espingardas de caça calibres 20, 32 e 8 mm.

A lista de espécies segue a proposta do CBRO (2005), estando a cada uma delas mencionadas as localidades de registro e sua fonte, seguindo o critério de ordem: registro bibliográfico (com a discriminação da referência bibliográfica), espécime de museu (com o acrônimo do acervo) e observação de campo (usando-se os acrônimos de observadores: FCS, Fernando Straube; BLR, Bianca Reinert; RK, Ricardo Krul; VSM, Valéria dos Santos Moraes; EC, Eduardo Carrano; AUF, Alberto Urben-Filho; DK, Douglas Kajiwara; MAGA, Marcos A.G.Azevedo). Em casos de registros cumulativos (*e.g.* Sztolcman, 1926 *in* Pichorim & Bóçon, 1996) remete-se apenas aos autores originais.

Para os nomes populares foram coletadas as designações regionais das espécies, coligidas durante os trabalhos de campo a partir de informantes locais e moradores da

área; nomes sem utilização local pela população, mas francamente citados na literatura corrente (*cf.* Sick, 1997), não foram incluídos.



Figura 3. Localidades já amostradas, de acordo com levantamento bibliográfico, em museus e campo, na área de estudo. Para denominações e coordenadas geográficas vide Anexo 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. COLETÂNEA DA AVIFAUNA

ORDEM TINAMIFORMES

FAMÍLIA TINAMIDAE

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)

macuco

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); UHE-Foz do Areia (EC).

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)

nambu-guaçu, nambu

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cará Pintada, Vermelho, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio Bragança (MHNCI); Fazenda Santa Clara (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia (EC); Fazenda São Pedro (DK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)

nambu-chororó, canela-roxa, nambuzinho

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio Vila Nova; Foz do Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)

nambu-xitã, nambuzinho

Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Faxinal do Céu (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)

perdiz, perdigão

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Guarapuava, Fazenda Firmiano (Jaczewski, 1925); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu; Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Nothura maculosa (Temminck, 1815)

codorna, perdiz

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

ORDEM ANSERIFORMES

FAMÍLIA ANATIDAE

Dendrocygna viduata (Linnaeus, ,1766)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

pato

Santa Cruz (Chrostowski, 1912); Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas (EC) ; Fazenda São Pedro (DK)

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)

marreca, paturi

Cará Pintada, Invernadinha (Sztolcman 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de

Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Anas bahamensis Linnaeus, 1758

É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Anas flavirostris Vieillot, 1817

Arredores de Palmas (EC)

Anas georgica Gmelin, 1789

Palmas (Scherer-Neto & Straube, 1995); Arredores de Palmas (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Netta peposaca (Vieillot, 1816)

Foz do Rio Vila Nova (Lara, 1992; FCS)

Nomonyx dominicus (Linnaeus, 1776)

Santa Cruz (Chrostowski, 1912).

ORDEM GALLIFORMES

FAMÍLIA CRACIDAE

Penelope superciliaris Temminck, 1815

jacu

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Parque Municipal das Araucárias (Belin *et al*., 2003); Santa Bárbara (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR)

Penelope obscura Temminck, 1815

jacu-velho

Fazenda Concórdia (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Fazenda Firmiano (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Vila Nova (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Pipile jacutinga (Spix, 1825)

jacutinga

Rio Ubasinho, Cândido de Abreu, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); UHE-Foz do Areia (EC)

FAMÍLIA ODONTOPHORIDAE

Odontophorus capueira (Spix, 1825)

uru

Fazenda Durski, Vermelho, Cândido de Abreu (Sichorim & Bóçon, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

ORDEM PODICIPEDIFORMES

FAMÍLIA PODICIPEDIDAE

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)

marrequinha

Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Arredores de Palmas (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)

Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

ORDEM PELECANIFORMES

FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)

biguá

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA ANHINGIDAE

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)

biguatinga

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988)

ORDEM CICONIIFORMES

FAMÍLIA ARDEIDAE

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

socó

Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do rio Jordão (FCS); UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Butorides striata (Linnaeus, 1758)

socó

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

garça-vaqueira, garça-boiadeira

UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)

garça-cinza

Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (MHNCI; FCS, BR); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK)

Ardea alba Linnaeus, 1758

garça-branca, garça

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)
garça-do-campo

Chapéu de Sol (Chrostowski, 1912); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda Estância Nova, Fazenda São Jerônimo (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Egretta thula (Molina, 1782)
garça, garcinha

Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)
curucaca

Guarapuava (Jaczewski, 1925); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda Estância Nova, Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA CICONIIDAE

Ciconia maguari (Gmelin, 1789)

Arredores de Palmas (EC).

ORDEM CATHARTIFORMES

FAMÍLIA CATHARTIDAE

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)
corvo-pimenta

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS) ; Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Cathartes burrovianus Cassin, 1845

Fazenda Coxilhão/km 35 da BR-280 (MAGA) [2]

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
corvo, urubu

Guarapuava (Jaczewski, 1925); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de

[2] Registro inédito de Marcos A.G.Azevedo (2005, *in litt*.), em 2 demarço de 2005, no exato ponto UTM: 0432628 e 7059770, nos arredores do Parque Eólico do Horizonte, porém em território catarinense.

Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)
corvo-branco, urubu-rei

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC).

ORDEM FALCONIFORMES

FAMÍLIA ACCIPITRIDAE

Leptodon cayanensis (Latham, 1790)

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996) ; Faxinal do Céu (EC).

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)
gavião-tesoureiro, tesoura

Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)
gavião-pombo

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Foz do Rio Capoteiro (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Harpagus diodon (Temminck, 1823)

Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Rio Jordão (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK)

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)
gavião-pombo

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Ribeirão Estreito; Foz do Rio dos Touros (MHNCI; MN); UHE-Segredo(FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Teresina, Vermelho (Sztolcman, 1926). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Accipiter striatus Vieilliot, 1807

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)

Fazenda Durski, Guarapuava, Vermelho (Sztolcman, 1926); UHE-Segredo (FCS, BLR)

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1819)

Palmeiral (RK).

Leucopternis polionotus (Kaup, 1847)
gavião-branco

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Fazendas São Pedro e Santa Cândida (Straube *et al*., 2005); Posto Indígena, Palmas (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Rio Bonito/BR-466 (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788)

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK).

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)
gavião-fumaça

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK)

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817)

Clevelândia; Coronel Domingos Soares (Straube *et al*., 2005).

Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824)

Invernadinha (Sztolcman, 1926)

Percnohierax leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824)

Palmeiral (MHNCI); Fazenda São Pedro (DK)

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)
gavião, pega-pinto

Fazenda Durski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Mallet, Fazenda Concórdia, Guarapuava, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmas, Ribeirão Estreito (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Buteo albicaudatus Vieillot, 1816

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988) ; Fazenda São Pedro (DK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Buteo melanoleucus (Vieillot, ,1819)

Arredores de Palmas (EC).

Buteo brachyurus Vieillot, 1816

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC).

Buteo albonotatus Kaup, 1847

Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)

Palmas (Pinto, 1938; MHNCI), General Carneiro (Straube *et al*., 2005); Laranjeiras do Sul (MHNCI).

Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816)

Fazenda São Pedro (DK, Straube *et al*., 2005), Turvo (Straube *et al*., 2005).

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)

Guarapuava (espécime exposto no Museu Municipal de Guarapuava, capturado nos arredores desse município em janeiro de 2002: S.A.A.Morato com.pess.); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Spizaetus ornatus (Daudin, 1801)

Palmas (Straube *et al*., 2005).

FAMÍLIA FALCONIDAE

Caracara plancus (Miller, 1717)

carancho

Chapéu de Sol (Chrostowski, 1912); Guarapuava (Jaczewski, 1925); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de uma localidade paranaense não discriminada (Rosário, 1996).

Milvago chimango (Vieillot, 1816)

É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

pinhé, gavião-carrapateiro

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu; UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) [3]

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cará Pintada, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; *vide* nota de rodapé); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Fazenda São Pedro (DK)

Falco sparverius Linnaeus, 1758

gaviãozinho

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Guarapuava (Jaczewski, 1925); Fazenda Durski, Apucarana (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Fazenda Concórdia, Invernadinha, Vermelho, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu, Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Santa Bárbara, Rio Jararaca, Fazenda São Jerônimo, Posto Indígena, Vila Segredo, Ribeirão Estreito (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de uma localidade paranaense não discriminada (Rosário, 1996).

---

[3] Por razões perfeitamente resolvidas (Sick, 1997), os registros atribuídos a *Micrastur gilvicollis* para "Cará Pintada" (Sztolcman, 1926), devem ser repassados para sua congenérica *M.ruficollis*, cuja plumagem juvenil já causou certas confusões na literatura.

Falco rufigularis Daudin, 1800
Cândido de Abreu, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926) ; Fazenda São Pedro (DK); Rio Bonito/BR-466 (EC).

Falco femoralis (Temminck, 1822)
gavião-de-coleira
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

ORDEM GRUIFORMES
FAMÍLIA RALLIDAE
Aramides saracura (Spix, 1825) [4]
saracura-do-mato
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet, Fazenda Concórdia (Jaczewski, 1925); Vermelho (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988: v*ide* nota de rodapé); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819)
monjolinho
Foz do Rio Vila Nova (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819)
Fazenda Coxilhão/km 35 da BR-280 (MAGA) [5]

Porzana albicollis (Vieillot, 1819)
UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)
saracura
Vermelho (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1838)
Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
frango-d'água
Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de duas localidades paranaenses não discriminadas (Rosário, 1996).

Porphyrio martinica (Linnaeus,1766)

---

[4] O registro de *Aramides saracura* para a "Fazenda Iguaçu" (Straube, 1988) trata-se de equívoco por descuido de revisão (FCS), devendo ser convertido para *A.saracura*.

[5] Registro inédito de Marcos A.G.Azevedo (2005, *in litt.*), em 1º de abril de 2004, no exato ponto UTM: 0433277 e 7061215, numa área alagada dentro do Parque Eólico do Horizonte, porém em território catarinense. O exemplar, capturado em armadilha para pequenos mamíferos, foi coletado e depositado no Museu de Zoologia da FURB, em Blumenau.

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996).

Fulica rufifrons (Phillipi & Landbeck, 1861)
Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

ORDEM CHARADRIIFORMES

FAMÍLIA JACANIDAE

Jacana jacana (Linnaeus, 1766)
jaçanã
Santa Cruz (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia (Jaczewski, 1925); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

Himantopus melanurus (Vieillot, 1817)
Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

FAMÍLIA CHARADRIIDAE

Vanellus cayanus (Latham, 1790)
Vera Guarani (Chrostowski, 1912)

Vanellus chilensis (Molina, 1782)
quero-quero
Guarapuava (Jaczewski, 1925); Fazenda Durski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Invernadinha (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de duas localidades paranaenses não discriminadas (Rosário, 1996).

Charadrius collaris Vieillot, 1818
Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001)

FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)
Santa Cruz (Chrostowski, 1912); Solais (Straube, 1988); Arredores de Palmas (EC).

Gallinago undulata (Boddaert, 1783)
Vera Guarani (Chrostowski, 1912)

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)
Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)
Arredores de Palmas (EC)

Tringa solitaria Wilson, 1813
Santa Cruz (Chrostowski, 1912).

Actitis macularius (Linnaeus, 1766)
Palmeiral (RK)

ORDEM COLUMBIFORMES

FAMÍLIA COLUMBIDAE

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)

rolinha

Fazenda Iguaçu, Solais (STRAUBE, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Butiá; Foz do Rio Capoteiro (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de duas localidades paranaenses não discriminadas (Rosário, 1996).

Columbina squammata (Lesson, 1831)

fogo-pagou

Invernadinha (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (MHNCI; FCS, BR); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Columbina picui (Temminck, 1813)

rolinha

UHE-Segredo (FCS, BLR); Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)

asa-branca

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Ribeirão Estreito (MUHS);UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Patagioenas cayennensis (Bonaterre, 1792)

pomba-do-ar

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Ferreira (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)

pomba-do-mato

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Zenaida auriculata Des Murs, 1847

amargosinha

Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Vila de Segredo (MHNCI); Foz do Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)
juriti

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Invernadinha, Teresina, (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Santa Bárbara, Fazenda Santa Júlia, Fazenda São Pedro, Palmeiral, Papuã, Foz do Rio dos Touros (MHNCI); Foz do Rio da Divisa (MHNCI; MN); Foz do Rio Bragança (MN); Ribeirão Estreito; Foz do Rio Butiá (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1712)
juriti

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (MHNCI; FCS, BR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Geotrygon violacea (Temminck, 1810)

Vermelho (Sztolcman, 1926)

ORDEM PSITTACIFORMES

FAMÍLIA PSITTACIDAE

Primolius maracana (Vieillot, 1816)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Posto Indígena (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR)

Aratinga leucophthalma (Müller, 1776)
maritaca

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Fazenda São Jerônimo; Ribeirão Estreito (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC).

Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820)
jandaia

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Foz do Rio Jordão (Straube, 1988); UHE-Foz do Areia, Rio Bonito/BR-466 (EC)

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817)
tiriva

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Cará Pintada, Vermelho, (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Santa Bárbara, Fazenda São Jerônimo, Pinhão, Foz do Rio Iratim (MHNCI); Foz do Rio Butiá (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para

as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de uma localidade paranaense não discriminada (Rosário, 1996).

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788)

Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1767)

cuiu-cuiu

Teresina (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988; MHNCI); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)

baitaca

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Invernadinha (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão Estreito (MHNCI; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)

papagaio

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Amazona vinacea (Kuhl, 1820)

papagaio-de-peito-roxo

Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (FMNH); Reserva do Rio dos Touros (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

ORDEM CUCULIFORMES

FAMÍLIA CUCULIDAE

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Coccyzus euleri Cabanis, 1783

Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC).

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817

Cândido de Abreu, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio Xagu (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Faxinal do Céu (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC).

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

rabo-de-palha, alma-de-gato

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Invernadinha, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-

Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Foz do Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Crotophaga major Gmelin, 1788
anu-coroca

Rio Ubasinho, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Crotophaga ani Linnaeus, 1758
anu-preto

Vermelho (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu, Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Guira guira (Gmelin, 1788)
anu, alma-de-gato

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Parque Municipal das Araucárias (Belin *et al*., 2003); Guarapuava (MHNCI); Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)
saci

Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC).

ORDEM STRIGIFORMES

FAMÍLIA TYTONIDAE

Tyto alba (Scopoli, 1769)
coruja-branca, suindara

Solais (Straube, 1988); Fazenda Três Capões (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Fazenda São Pedro (DK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

FAMÍLIA STRIGIDAE

Megascops choliba (Vieillot, 1817)
corujinha

Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Rondinha/Paula Freitas (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK)

Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897) [6]
corujinha
Vermelho (Sztolcman, 1926); Ribeirão Estreito (MHNCI; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR)

Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901)
Parque Municipal das Araucárias (Belin *et al.*, 2003); Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Strix hylophila Temminck, 1825
coruja
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Strix virgata (Cassin, 1849)
Rio Bonito/BR-466 (EC).

Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) [7]
caburezinho
Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Solais (Straube, 1988; MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS).

Athene cunicularia (Molina, 1782)
coruja-do-campo
Guarapuava (Jaczewski, 1925); Invernadinha (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); Covó (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Rhinoptynx clamator (Vieillot, 1808)
coruja-de-orelha
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996).

Asio stygius (Wagler, 1832)
Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996).

---

[6] Em nossa opinião permanece a dúvida sobre a validade dessa espécie, cuja revisão recente baseia-se em caracteres vocais e, aparentemente, em análises morfológicas ainda insuficientes frente ao enorme polimorfismo envolvido.

[7] Embora perfeitamente distinguíveis pela vocalização, as duas espécies meridionais do gênero *Glaucidium* são separadas morfologicamente apenas por discretas diferenças no colorido da cauda (Sick, 1997) o que torna-se praticamente impossível em vários exemplares do morfo ferrugíneo, nos quais essas barras são muitas vezes indistinguíveis. Os registros de *G.ferox* para a área de estudo (Sztolcman, 1926) referem-se muito provavelmente a *G.brasilianum* que é comum localmente, ao contrário de *G.minutissimum*,conhecida em poucas localidades no Estado do Paraná (Scherer-Neto & Straube, 1995). A questão, contudo, deve ser mantida como duvidosa até uma reanálise dos exemplares obtidos. O mesmo não se aplica aos registros posteriores, baseados em características definitivas. Localidades provisoriamente desconsideradas: *Glaucidium brasilianum*: Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Rio Jordão, Vermelho, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); *Glaucidium ferox*: Rio Claro, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Cará Pintada, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926).

ORDEM CAPRIMULGIFORMES

FAMÍLIA NYCTIBIIDAE

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

urutágua, urutau, mãe-da-lua

Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK)

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1788)

sundaia

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Chordeiles minor (Forster, 1771)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Podager nacunda (Vieillot, 1817)

Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Jordão (MHNCI); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)

curiango

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio Bragança (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Caprimulgus parvulus Gould, 1837

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996).

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)

Rio Bonito/BR-466 (EC)

Macropsalis forcipata (Nitzsch, 1840)

curiango-tesoureiro

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK)

ORDEM APODIFORMES

FAMÍLIA APODIDAE

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1840)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Cypseloides senex (Temminck, 1826)

UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907

UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Arredores de Palmas (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA TROCHILIDAE

Phaethornis squalidus (Temminck, 1822)

Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)

beija-flor

Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Ribeirão Estreito, Foz do Rio Jordão (MHNCI); Reserva Rio dos Touros (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Florisuga fusca (Vieillot, 1817)

beija-flor

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988)

Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)

beija-flor

Fazenda Firmiano (Sztoclman, 1926); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)

beija-flor

Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR)

Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) [8]

beija-flor

Fazenda Durski, Teresina (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão Estreito (MUHS); Foz do Rio dos Touros (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Chlorostilbon aureoventris (D'Orbigny & Lafresnaye, 1838)

beija-flor

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK)

---

[8] A populações meridionais desta espécie, ainda denominadas na literatura *S.l.loddigesi* (Gould, 1830), merecem um *split* da forma nominal, com base em nítidas diferenças morfológicas (em particular a cor do topete) e em suporte biogeográfico mais do que satisfatório (*vide* Silva & Straube, 1996)

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)
Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Foz do Areia (EC); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Hylocharis cyanus (Vieillot, 1818)
Rio Bonito/BR-466 (EC).

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)
beija-flor
Rio Claro (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Posto Indígena (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818)
Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001)

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)
Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001)

Calliphlox amethystina (Gmelin, 1788)
beija-flor
Rio Claro (Chrostowski, 1912); Palmeiral (MHNCI).

ORDEM TROGONIFORMES
FAMÍLIA TROGONIDAE
Trogon surrucura Vieillot, 1817
surucuá
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Papuã, Fazenda Pitanga, Foz do Rio dos Touros (MHNCI); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Trogon rufus Gmelin, 1788
surucuá-do-amarelo
Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Foz do Rio Bragança (MHNCI); Foz do Rio da Divisa, Reserva Rio dos Touros (MN); Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC).

ORDEM CORACIIFORMES
FAMÍLIA ALCEDINIDAE
Ceryle torquatus (Linnaeus, 1766)
martim-pescador-do-grande
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de uma localidade paranaense não discriminada (Rosário, 1996).

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)
martim-pescador

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Solais (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio Jararaca, Barra do Rio Iguaçu em Laranjeiras do Sul, Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo; Foz do Rio Jordão (FCS); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)
martim-pescador

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Durski (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Posto Indígena, Fazenda Santa Júlia (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

FAMÍLIA MOMOTIDAE

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818)
jiruva, juruva, tirivão

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio da Divisa, Foz do Rio Bragança (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC).

ORDEM GALBULIFORMES

FAMÍLIA BUCCONIDAE

Notharchus swainsoni (Gray, 1846)

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926).

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)
joão-bobo

Mallet (Jaczewski, 1925); Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Palmeiral, Reserva (MHNCI); Ribeirão da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de duas localidades paranaenses não discriminadas (Rosário, 1996).

Malacoptila striata (Spix, 1824)

Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001)

Nonnula rubecula (Spix, 1824) [9]

Vera Guarani (Chrostowski, 1912; 1921); Vermelho (Sztolcman, 1926; *vide* nota de rodapé); 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Ribeirão Estreito, Foz do Rio Jordão (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Estância Hidromineral SantaClara (EC).

ORDEM PICIFORMES

FAMÍLIA RAMPHASTIDAE

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766
tucano

[9] A dúvida, assumida por Sztolcman (1926), quanto à identificação dos exemplares coligidos por Chrostowski, deve-se à descrição de *Nonnula hellmayri* (Chrostowski, 1921) que, até o momento, consta como sinônimo-júnior de *N.rubecula* (Pinto, 1938).

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Santa Bárbara, Posto Indígena (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, além de uma localidade paranaense não discriminada (Rosário, 1996).

Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823)
tucaninho

UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS)

Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819)

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH)

FAMÍLIA PICIDAE

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Banhado, Rio Ubasinho, Apucarana (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu, Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão Estreito (MHNCI; MUHS); Reserva Rio dos Touros (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Picumnus nebulosus (Sundevall, 1866)

Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Rio Jordão, Invernadinha, Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Parque Municipal das Araucárias (Belin *et al*., 2003); Posto Indígena, Palmeiral (MHNCI); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Melanerpes candidus (Otto, 1796)
pica-pau-branco

Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR), Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda São Jerônimo, Papuã, Foz do Rio Butiá (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)
picapauzinho

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Vermelho, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Santa Bárbara, Posto Indígena, Papuã, Ribeirão Estreito (MHNCI); Pedregulho; Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita, Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Piculus aurulentus (Temminck, 1823)

Fazenda Firmiano, Vermelho, Cará Pintada, Banhado (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu, Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Posto Indígena, Papuã, Palmeiral (MHNCI); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)

pica-pau

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Posto Indígena, Guarapuava, Pinhão, Papuã (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)

pica-pau-do-campo, pica-chanchan

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet (Jaczewski, 1925); Fazenda Concórdia, Fazenda Durski, Fazenda Ferreira, Vermelho, Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Posto Indígena, Reserva (MHNCI); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, inclusive uma localidade paranaense não discriminada (Rosário, 1996).

Celeus flavescens (Gmelin, 1788)

Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH)

Dryocopus galeatus (Temminck, 1822)

Fazenda Durski (Jaczewski, 1925); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)

pica-pau-da-cabeça-vermelha

Fazenda Durski (Jaczewski, 1925); Fazenda Concórdia, Invernadinha, Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (PICHORIM & BÓÇON, 1996); Fazenda São Jerônimo, Posto Indígena, Fazenda Santa Júlia, Ribeirão Estreito (MHNCI); Apucarana (FMNH); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Campephilus robustus (Lichtenstein, 1819)

pica-pau-da-cabeça-vermelha

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Mallet, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Fazenda São Jerônimo, Santa Bárbara, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

ORDEM PASSERIFORMES

FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE

Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816)

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Rio Bonito/BR-466 (EC).

Batara cinerea (Vieillot, 1819) [10]

papa-ovo

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Durski, Rio Ubasinho (Sztolcman, 1926; vide nota de rodapé); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Mackenziaena leachii (Such, 1825)

brujara-da-carijó

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet, Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Santa Bárbara, Palmeiral, Fazenda Fiat Lux; Foz do Rio dos Touros (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823)

brujara-preta

Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Jordão, Ribeirão Estreito (MHNCI); Foz do Rio Capoteiro (MHNCI; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS)

Biatas nigropectus (Lafresnaye, 1850)

Pinhão, Rio Jordão-Cachoeira da Vaca Branca (Straube *et al*., 2005)

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Rio da Areia, Fazenda Firmiano, Fazenda Durski, Invernadinha, Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena, Paula Freitas, Palmeiral, Reserva; Foz do Rio dos Touros; Foz do Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita, Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816

Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Mallet (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)

Cará Pintada, Vermelho, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão Estreito; Foz do Rio da Divisa (MHNCI; MN; MUHS); Foz do Rio Capoteiro; Reserva do Rio dos Touros; UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

---

[10] Os exemplares da "Fazenda Durski" e "Rio Ubasinho" que serviram à descrição de *Batara chrostowskii* por Sztolcman (1926), não diferem em nada, com base na descrição oferecida, do padrão de plumagem e medidas de sua congenérica *B.cinerea* (FCS).

Myrmotherula gularis (Spix, 1825)
Fazenda Iguaçu (Straube, 1988).

Drymophila rubricollis Bertoni, 1901 [11]
Fazenda Concórdia, Fazenda Durski, Cará Pintada, Vermelho, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926: *vide* nota de rodapé); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio Capoteiro (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR).

Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906)
Teresina, Cândido de Abreu, Salto de Ubá, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926)

Drymophila malura (Temminck, 1825)
Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Cará Pintada, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Foz do Rio dos Touros (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK)

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818)
Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS) ; Fazenda São Pedro (DK)

Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868
Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001).

FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE

Conopophaga lineata (Wied, 1831)
Fazenda Concórdia, Vermelho (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral, Foz do Rio Jordão (MHNCI); Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Barra Bonita (FCS, AUF); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA GRALLARIIDAE

Grallaria varia (Boddaert, 1783)
sorová
Teresina (Sztolcman, 1926); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS)

Hylopezus nattereri (Pinto, 1937)
Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Banhado, Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Papuã (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE

Psiloramphus guttatus (Ménétriès, 1835)
Foz do Rio Jordão (FCS); Rio Bonito/BR-466 (EC).

---

[11] Apenas recentemente - e definitivamente - separada de sua congenérica *Drymophila ferruginea* (*vide* Sick, 1997), abarca todos os registros planálticos consignados a ela que, no Paraná, apresenta uma distribuição tipicamente restrita à planície litorânea.

Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835)

Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Palmeiral (RK); Fazenda São Pedro (DK).

Scytalopus iraiensis Bornschein, Reinert & Pichorim,1998 [12]

Procopiak, Fuck, Palmeiral (RK); Fazenda São Pedro (DK).

Scytalopus indigoticus (Wied, 1831)

Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); UHE-Segredo (FCS, BLR); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA FORMICARIIDAE

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) [13]

tovaca, sovaca, codorninha

Foz do Rio Capoteiro (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996) (*vide* comentários).

Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859)

Fazenda Concórdia (Jaczewski, 1925); Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Palmeiral (RK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA SCLERURIDAE

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988; MHNCI); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Barra Bonita (FCS, AUF).

FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)

subideira

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Guarapuava, Vermelho, (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Posto Indígena, Fazenda Santa Júlia, Reserva (MHNCI); Foz do Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina e uma localidade (não discriminada) no interior do Paraná (Rosário, 1996).

---

[12] Esses seriam os registros mais ocidentais desta espécie de distribuição reduzidíssima, confinada a poucas regiões sulinas onde predominam "várzeas situadas na planície de inundação de rios" (Bornschein *et al.*, 2001)

[13] Torna-se praticamente impossível, sem análise dos exemplares comprobatórios, a reavaliação das espécies atribuídas à espécie sob algum de seus sinônimos (p.ex. *C.brevicauda*). Isso se deve pelo desmembramento da mesma em duas espécies válidas (Willis, 1992; Raposo & Teixeira, 1992), bem como pela comprovação da presença, em território parananese, de sua congenérica *C.meruloides* (Urben-Filho *et al*., 2001). As localidades desconsideradas são: sob "*Chamaeza brevicauda* (Vieill.)": Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia (Jaczewski, 1925); Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); sob *Chamaeza campanisona*: Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988) e Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996).

Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Invernadinha, Vermelho, (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Posto Indígena, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825

Banhado, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda São Jerônimo, Posto Indígena, Palmeiral (MHNCI); Reserva do Rio dos Touros (MHNCI; MN; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818)

subideira

Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Santa Clara (MHNCI); Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo (MHNCI; FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859)

Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Rio Jordão, Vermelho (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda Estância Nova, Posto Indígena, Fazenda Santa Júlia, Papuã (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Campyloramphus falcularius (Vieillot, 1822)

Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC).

FAMÍLIA FURNARIIDAE

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)

joão-de-barro

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio Vila Nova; Foz do Rio dos Touros (MHNCI); Foz do Rio Vila Nova (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, inclusive uma localidade paranaense não discriminada (Rosário, 1996).

Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856)

Rio da Areia (Jaczewski, 1925); Fazenda Concórdia (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Rio Jordão (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996), Palmeiral (MHNCI); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu (EC).

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824)

grimpeirinho

Fazenda Concórdia (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Mallet, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Rio Jordão, Invernadinha, Cará Pintada, Invernadinha (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Parque Municipal das Araucárias (Belin *et al.*, 2003); Palmeiral, Mallet, Reserva (MHNCI); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia

(FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819

Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Rio Jordão, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Synallaxis cinerascens Temminck, 1823

Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Durski, Rio Jordão, Cará Pintada, Cândido de Abreu, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Reserva, Foz do Rio dos Touros (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN; MUHS); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Synallaxis spixi Sclater, 1856

Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Teresina (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853)

Mallet, Fazenda Concórdia, Rio da Areia, Fazenda Durski, Rio Jordão, Invernadinha, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Fazenda São Pedro, Pedregulho (MHNCI); Foz do Rio Butiá (MN); Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Cranioleuca pallida (Wied, ,1831)

Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC).

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996).

Phacellodomus striaticollis (D'Orbigny & Lafresnaye, 1808)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 1859)

Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Vermelho, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); Ribeirão Estreito (MHNCI; MN); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)

pedreiro, cochicho

Guarapuava (Jaczewski, 1925); Invernadinha (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Posto Indígena; Reserva (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Arredores de Palmas, Estância

Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832)

Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Durski, Banhado, Cará Pintada, Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Philydor lichtensteini (Cabanis &Heine, 1859)

Cândido de Abreu, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996).

Philydor atricapillus (Wied, 1821)

Salto de Ubá (Sztolcman, 1926).

Philydor rufum (Vieillot, 1818)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Invernadinha, Fazenda Durski (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Solais (Straube, 1988); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Reserva (MHNCI); Rio Bragança (MN); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC)

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830)

Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001).

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821)

Salto de Ubá (Sztolcman, 1926).

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823)

Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Durski, Invernadinha, Cará Pintada, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena, Fazenda Santa Júlia, Palmeiral, Reserva do Rio dos Touros (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Xenops minutus (Sparrman, 1788)

Palmeiral (RK)

Xenops rutilans Temminck, 1821

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Teresina, Rio Ubasinho, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988; MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

FAMÍLIA TYRANNIDAE

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846

Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Divisa, Foz do Rio Jordão (MHNCI); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846

Invernadinha, Vermelho, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio Bragança (MHNCI), Ribeirão Estreito (MHNCI; MN; MUHS); Fazenda Santa Clara (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Corythopis delalandi

Rio Bonito/BR-466 (EC).

Hemitriccus diops (Temminck, 1822)

Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Durski, Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Foz do Rio Capoteiro (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS)

Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906) [14]

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); General Carneiro (Straube *et al*., 2005); Posto Indígena, Palmeiral (MHNCI; vide nota de rodapé); UHE-Segredo (FCS, BLR); Rio Bonito/BR-466 (EC).

Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) [15]

Rio Claro, Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926: *vide* comentários); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena, Palmeiral (MHNCI); Ribeirão Estreito (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Phyllomyias burmeisteri (Cabanis & Heine, 1859)

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Marumbi, Ribeirão Estreito (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK).

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824)

Fazenda Firmiano, Fazenda Durski, Guarapuava, Cará Pintada, Vermelho, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral, Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)

Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

---

[14] Não é possível considerar razoavelmente explicada, sequer definitiva, a questão taxonômica do grupo de populações que se encontram sob a denominação de *H.obsoletus*; haja vista o tentador split da forma meridional *H.o.zimmeri* Traylor, 1979, no mínimo com base em subsídios biogeográficos (vide Silva & Straube, 1995). Ademais, o exemplar obtido em "Estância Nova" por A.Mayer e depositado no MHNCI, difere profundamente da série de exemplares analisados em vários museus brasileiros, por seu colorido quase que uniformemente castanho, sem tons oliváceos.

[15] São transferidos a essa espécie aqueles mencionados (com dúvidas) para *Euscarthmus gularis* (Temminck) por Sztolcman (1926), tal como proposto por Pinto (1944) e Traylor (1979).

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817)
Cândido de Abreu, Salto de Ubá, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Bragança (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR).

Myiopagis caniceps (Swainson, 1836)
Fazenda Durski, Rio Jordão, Cará Pintada, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)
Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Elaenia parvirostris (Pelzeln, 1868) [16]
tuque
Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Faxinal do Céu (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC).

Elaenia mesoleuca (Cabanis & Heine, 1859)
tuque
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet, Fazenda Concórdia, Rio da Areia, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Guarapuava (Sztolcman, 1926). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Elaenia obscura (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837)
Fazenda Concórdia, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)
caga-sebo
Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia (EC), Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC; MHNCI); Fazenda São Pedro (DK).

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)
Mallet, Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Guarapuava, Cará Pintada, Teresina (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Papuã, Mallet, Covó (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817)
Fazenda Firmiano, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823)
Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

---

[16] As identificações de exemplares, bem como dos registros visuais atribuídos a esta e à espécie seguinte, são obviamente provisórias, com base na argumentação de Scherer-Neto & Straube (1995).

Euscarthmus meloryphus Wied, 1818
Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Foz do Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR).

Phylloscartes eximius (Temminck, 1822)
Guarapuava, Vermelho, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Solais, Papuã (MHNCI); Rio da Divisa (MHNCI; MN); Foz do Rio Bragança (MN); UHE-Segredo (FCS, BLR); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824)
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Invernadinha, Cará Pintada, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena (MHNCI); Foz do Rio Bragança (MHNCI; MN); Foz do Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Phylloscartes paulista Ihering & Ihering, 1907
Palmeiral (RK)

Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907) [17]
Teresina, Cândido de Abreu, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926)

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)
Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Palmeiral (MHNCI); Ribeirão Estreito (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)
Rio Jordão, Guarapuava, Vermelho, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Ribeirão Estreito (MHNCI); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Myiophobus fasciatus (Müller, 1776)
Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Durski (Sztolcman, 1926); São Pedro (MHNCI); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda São Pedro

---

[17] Apesar da inesperada presença na região de transição com a floresta estacional e não na área em que era julgada privativa (zonas de grandes altitudes do complexo montanhoso da Serra do Mar), é forçoso admitir a validade dos registros de Sztolcman (1926), ao contrário do questionado por Pinto (1944). Isso se deve, em particular, ao detalhamento nas informações de coloração e medidas, com base nos quais o autor fornece não somente uma visão clara da diferença entre os espécimes mas também uma autêntica redescrição da espécie, originalmente batizada em 1907 pelos Ihering. Os aludidos exemplares, contudo, parecem permanentemente extraviados do acervo do Museu de Varsóvia (M.Luniak, 2003, *in litt*.).

(MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)

Rio Claro (Chrostowski, 1912); Fazenda Durski (Sztolcman, 1926); Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)

Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Cândido de Abreu, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Papuã (MHNCI); Fazenda Santa Clara (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831)

Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Contopus cinereus Spix, 1825

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Durski, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Solais (Straube, 1988); Fazenda Iguaçu (MHNCI); Foz do Rio Butiá (MHNCI; MN); UHE-Segredo (FCS, BLR); UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)

sangue-de-boi

Guarapuava (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Palmeiral (MHNCI); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818)

Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Durski, Vermelho, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Papuã (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF) ; Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789)

Entre Rios, município de Guarapuava (Straube *et al*., 2005)

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)

Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816)

noivinha

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Invernadinha (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Posto Indígena (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, na localidade de Matos Costa (Rosário, 1996; Piacentini *et al.*, 2004).

Xolmis dominicanus (Vieillot, 1823)

Solais (Straube, 1988); Fazenda Estância Nova (MHNCI); Arredores de Palmas (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Papuã, Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Colonia colonus (Vieillot, 1818)

pito-de-velha

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Butiá (MHNCI); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)

Mallet (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Myiozetetes similis (Spix, 1825)

bem-te-vi-do-pequeno

Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Foz do Rio Butiá (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

bem-te-vi

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet (Chrostowski, 1912; Jaczewski, 1925); Cará Pintada, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Posto Indígena (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Myiodynastes maculatus (Müller, 1776)

Rio Jordão (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Santa Júlia (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)

bem-te-vi

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Butiá (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Empidonomus varius (Vieillot, 1818)

Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral (MHNCI); Rio Bragança (MN); Rio Bragança; Foz do Rio Butiá (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC).

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

siriri

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Iratim (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Tyrannus savana Vieillot, 1808

tesoura

Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Covó (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818)

Vermelho, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio da Divisa (MHNCI, MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859

Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Teresina, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão Estreito, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)

Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 1835)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Attila phoenicurus Pelzeln, 1868

boiadeiro

Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Iratim (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS)

FAMÍLIA COTINGIDAE

Phibalura flavirostris Vieillot, 1816

Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Entre Rios - município de Guarapuava (Straube *et al*., 2005); Papuã (MHNCI); Palmeiral (RK); Rio Bonito/BR-466 (EC).

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)
araponga
Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR).

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792)
pavão
Invernadinha, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Santa Bárbara, Reserva (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK).

FAMÍLIA PIPRIDAE

Piprites chloris (Temminck, 1822)
Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR).

Piprites pileatus (Temminck, 1822)
Invernadinha, Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Posto Indígena (MHNCI).

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793)
tangará
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Vermelho (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão Estreito (MHNCI; MUHS); Reserva Rio dos Touros (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK)

FAMÍLIA TITYRIDAE

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838)
Cará Pintada, Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio da Divisa (MHNCI; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Barra Bonita (FCS, AUF); Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)
Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS).

Tityra cayana (Linnaeus, 1766)
Mallet, Fazenda Durski (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH), Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Ribeirão Estreito; Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Foz do Rio Iratim (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC).

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816)
Invernadinha, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827)

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena, Papuã (MHNCI); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818)

Guarapuava, Invernadinha (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Rio da Divisa (MHNCI; MN); Foz do Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823)

Mallet, Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda Santa Júlia, Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

FAMÍLIA VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis Gmelin, 1789 [18]

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Durski, Invernadinha, Cará Pintada, Mallet, Teresina (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda Santa Júlia, Posto Indígena, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Foz do Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)

jiruviara

Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Durski (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Mallet (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio dos Touros (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822

Banhado, Fazenda Durski, Cará Pintada, Teresina (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

FAMÍLIA CORVIDAE

Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) [19]

gralha-azul

---

[18] Com base em material obtido por Chrostowski, Sztolcman (1926) descreveu Cyclarhis *jaczewskii*, cuja validade é aqui posta em suspeita uma vez que se enquadra perfeitamente na variação de medidas e coloração de plumagem de *C.gujanensis* (*vide* Pinto, 1944).

[19] Todos os exemplares da região sul do Paraná aqui indicados, apresentam a coloração de plumagem observada nas populações planálticas, ou seja, azul celeste claro, morfotipo que contrasta fortemente com o dos espécimes obtidos na região litorânea paranaense, todos com forte tonalidade violácea. Tal peculiaridade foi notada tanto nos exemplares do MHNCI, quanto naqueles que se encontram depositados em Varsóvia (D.M.Teixeira, 1993, *in litt*.), sendo evidentemente merecedora de avaliações taxonômicas futuras.

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Invernadinha (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Santa Bárbara, Fazenda Estância Nova, Fazenda São Jerônimo, Posto Indígena, Fazenda Santa Júlia, Guarapuava, Pinhão (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818)
gralha-amarela

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Teresina (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Fazenda Estância Nova, Santa Bárbara, Fazenda São Jerônimo, Fazenda Santa Júlia, Trabuco, 15 km NE da Foz do Rio Jordão (MHNCI); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (MHNCI; FCS), Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)
andorinha-do-rio

Teresina, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK)

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)
andorinha

Solais (Straube, 1988); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Progne tapera (Vieillot, 1817)

Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Progne chalybea (Linnaeus, 1789)
andorinha-da-grande

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Ferreira (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Reserva do Iguaçu (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)
andorinha

Fazenda Ferreira, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)

Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)
andorinha-do-campo

Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Reserva, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda Coxilhão/km 35 da BR-280 (MAGA) [20].

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE

Cistothorus platensis (Latham, 1790)

Guarapuava (Scherer-Neto & Straube, 1995); Arredores de Palmas (EC).

Troglodytes musculus Naumann, 1823

corruíra

Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Vermelho (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA POLIOPTILIDAE

Polioptila lactea Sharpe, 1885

Teresina (Sztolcman, 1926); Ribeirão Estreito (MHNCI; MN); UHE-Segredo (FCS, BLR).

FAMÍLIA TURDIDAE

Platycichla flavipes (Vieillot, 1818)

sabiá-preta

Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); UHE-Segredo (FCS, BLR)

Turdus subalaris (Seebohm, 1887)

sabiá-correntina

Mallet, Invernadinha, Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Reserva, Foz do Rio Butiá (MHNCI); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Turdus rufiventris Vieillot, 1818

sabiá-laranja, sabiá-do-peito-vermelho

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Guarapuava (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu, Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio da Divisa (MHNCI; MUHS); Ribeirão Estreito (MN); Foz do Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Turdus leucomelas Vieillot, 1818

[20] Foi observada em diversas ocasiões no Parque Eólico do Horizonte, em território catarinense, bem como em todos os arredores, entre fevereiro e abril de 2005. Nesse período era muito comum, ,com bandos voando pelos campos menos degradados (M.A.G.Azevedo, 2005, *in litt.*).

sabiá

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena, Fazenda São Pedro (MHNCI); UHE-Segredo (MHNCI; FCS, BR); Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1851

sabiá-da-branca

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet, Fazenda Ferreira, Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Butiá (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Turdus albicollis Vieillot, 1818

sabiá-coleiro

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Invernadinha, Mallet (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Ribeirão Estreito (MHNCI; MN); Papuã, Rio da Divisa (MHNCI); Fazenda Santa Clara (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA MIMIDAE

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)

sabiá-do-campo

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Reserva (MHNCI); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA MOTACILLIDAE

Anthus lutescens Pucheran, 1855

Foz do Rio Jordão (FCS); Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Anthus correndera Vieillot, 1817

Fazenda Coxilhão/km 35 da BR-280 (MAGA) [21]

Anthus nattereri Sclater, 1878

Invernadinha (Sztolcman, 1926); Arredores de Palmas (EC).

Anthus hellmayri Hartert, 1909

Reserva (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR).

FAMÍLIA COEREBIDAE

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)

UHE-Foz do Areia (EC)

---

[21] Segundo M.A.G.Azevedo (2005, *in litt*.), é espécie das mais comuns na região do Parque Eólico do Horizonte, em especial em campos pouco alterados. Foi registrada por esse pesquisador nos meses de setembro e outubro de 2003, março e maio de 2004 e fevereiro e março de 2005, entre as UTMs 0432855 a 0432829 e 7060940 a 7059603.

FAMÍLIA THRAUPIDAE

Orchesticus abeillei (Lesson, 1839)

UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788)

tié-tinga

Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH), Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC).

Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Durski, Banhados, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda Iguaçu, Palmeiral, 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Foz do Rio Bragança; Foz do Rio Jordão, Foz do Rio dos Touros (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN); Rio da Divisa (MUHS); Foz do Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818)

Cará Pintada, Vermelho, Teresina, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Reserva, Rio da Divisa (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Piranga flava Vieillot, 1822

sangue-de-boi

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda Estância Nova (MHNCI); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK).

Habia rubica (Vieillot, 1817)

Cândido de Abreu, Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)

tié

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Mallet, Fazenda Concórdia, Guarapuava, Vermelho, Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Papuã, Palmeiral, 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Foz do Rio Iratim, Foz do Rio dos Touros (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN; MUHS); Foz do Rio Jordão (MHNCI; FCS); UHE-Segredo (MHNCI; FCS, BR); Rio da Divisa (MUHS); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)

sanhaço

Fazenda Ferreira (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Rio da Divisa (MN); Foz do Rio Butiá (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Thraupis bonariensis (Gmelin, 1789)
sanhaço-da-laranja

Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823)
cabeça-de-velho

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK).

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Tangara seledon (Müller, 1776)

Rio Jordão (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS)

Tangara peruviana (Desmarest, 1806)

É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Tangara preciosa (Cabanis, 1850)

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Guarapuava, Invernadinha, Cará Pintada, Vermelho (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Posto Indígena, Fazenda Estância Nova, Palmeiral (MHNCI); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Tersina viridis (Illiger, 1811)

Rio Claro (Chrostowski, 1912); Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Fazenda Santa Júlia, Ribeirão Estreito, Reserva (MHNCI); Rio Bragança (MN); Reserva Rio dos Touros (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)

Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)

Cará Pintada, Teresina, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Papuã, Marumbi, Fazenda Iguaçu, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK)

Conirostrum speciosum (Temminck, 1822)

Mallet, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Papuã, Palmeiral, Marumbi, Mallet (MHNCI); Foz do Rio da Divisa (MHNCI; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK)

FAMÍLIA EMBERIZIDAE

Zonotrichia capensis (Müller, 1776)
tico-tico, tijitica

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Foz do Rio Butiá; Foz do Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)
tico-tico-do-campo

Invernadinha (Sztolcman, 1926); Reserva (MHNCI); Rio Bragança (MN; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851

Mallet, Fazenda Concórdia, Fazenda Ferreira (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral, 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Ribeirão Estreito, Foz do Rio Jordão (MHNCI); Palmeiral (RK); Arredores de Palmas (EC).

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817)

Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina, bem como uma localidade paranaense plotada em mapa mas não indicada (Rosário, 1996).

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835)

Cará Pintada, Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); São Domingos (Straube *et al*., 2005); Papuã, Palmeiral (MHNCI); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK).

Poospiza nigrorufa Lafresnaye & d'Orbigny, 1837

UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Poospiza lateralis (Nordmann, 1835)
tico-tico-da-taquara

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Firmiano (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena, Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Sicalis citrina Pelzeln, 1870

Faxinal do Céu (EC)

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
terrinha, canarinho-da-terra

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Parque Municipal das Araucárias (Belin *et al*., 2003); Fazenda Estância Nova, Palmeiral, Covó, Foz do Rio Butiá (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Sicalis luteola (Sparrman, 1789) [22]

Mallet (Sztolcman, 1926; *vide* comentários); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Mallet, Foz do Rio Vila Nova (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817)

Invernadinha (Sztolcman, 1926) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC).

Emberizoides ypiranganus

É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Embernagra platensis (Gmelin, 1789)

Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas (EC), Estância Hidromineral Santa Clara (MHNCI; EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

tiziu

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Rio da Divisa; Foz do Rio Vila Nova (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) [23]

Foz do Rio Jordão (MHNCI).

Sporophila collaris (Boddaert, 1783)

É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1817)

coleira, coleirinho

Mallet, Fazenda Concórdia, Invernadinha, Teresina (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio Butiá (MHNCI; MUHS); Foz do Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

---

[22] *Sicalis paranaensis* descrita por Sztolcman (1926) com base em exemplares coletados por Chrostowski em "Marechal Mallet", provou ser sinônimo de *S.luteola* (Pinto, 1944).

[23] O exemplar citado como *Sporophila leucoptera* (Bóçon *et al.*, 1992; Scherer-Neto & Straube, 1995) é, na realidade, um *S.falcirostris*, conforme alertado por D.Buzzetti (1994, com.pess.) ao analisar o espécime.

Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)
É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Sporophila hypoxantha (Cabanis, ,1851)
Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)
curió
UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Faxinal do Céu (EC).

Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853)
Fazenda Concórdia, Banhado, Fazenda Durski, Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Palmeiral (MHNCI); Palmeiral (RK); UHE-Foz do Areia, Rio Bonito/BR-466 (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Arremon flavirostris Swainson, 1837 [24]
Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Foz do Rio Jordão (FCS)

Tiaris fuliginosus Wied, 1831
Foz do Rio Jordão (FCS).

Coryphospingus cucullatus (Müller, 1776)
Teresina, Rio Ubasinho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Vila de Segredo, 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Foz do Rio Jordão, Foz do Rio dos Touros (MHNCI); Foz do Rio Butiá (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

FAMÍLIA CARDINALIDAE

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800)
Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001).

Saltator similis (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837)
trinca-ferro
Fazenda Iguaçu (Straube, 1988; MHNCI), Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Foz do Rio Jordão (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN; MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Saltator maxillosus Cabanis, 1850
Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia, Fazenda Firmiano, Fazenda Ferreira, Banhado, Cará Pintada (Sztolcman, 1926); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena, Papuã (MHNCI); Palmeiral (RK) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Cyanoloxia glaucocaerulea (Lafresnaye & DOrbigny, 1837)
Teresina (Sztolcman, 1926); Palmeiral (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK).

---

[24] A identificação dessa espécie, frente a meros registros visuais, deve ser considerada provisória, haja vista o envolvimento de outra espécie (*Arremon semitorquatus*), recentemente validada e cuja distribuição meridional permanece quase que totalmente desconhecida (vide Raposo, 1997).

Cyanocompsa brissonii (Lichteinstein, 1823)
azulão

Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; FMNH); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Palmeiral, 15 km NE da Foz do Rio Jordão, Foz do Rio Butiá, Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Estância Hidromineral Santa Clara (EC, MHNCI), Rio Bonito/BR-466 (EC).

FAMÍLIA PARULIDAE

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817)

Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Estância Nova, Fazenda Pitanga, Palmeiral, Reserva (MHNCI); Rio da Divisa (MN); Fazenda Santa Clara; Rio Bragança (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)

Fazenda Ferreira, Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Palmeiral, Foz do Rio dos Touros, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Basileuterus culicivorus (Lichtenstein, 1830)
bispo

Fazenda Ferreira, Fazenda Durski, Teresina (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Santa Júlia, Posto Indígena (MHNCI); Foz do Rio Butiá, Foz do Rio Bragança, Foz do Rio da Divisa (MHNCI; MUHS); Ribeirão Estreito (MN; MUHS); Rio da Divisa (MN); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Margem do Rio Ivaí em Prudentópolis (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817)

Fazenda Concórdia, Fazenda Durski, Vermelho (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Posto Indígena, Foz do Rio Butiá, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); Ribeirão Estreito (MN; MUHS); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373, Barra Bonita (FCS, AUF); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821)

Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF).

FAMÍLIA ICTERIDAE

Psarocolius decumanus (Pallas, 1769)

Salto de Ubá (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; FMNH).

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766)

guaxe

Teresina (Sztolcman, 1926); Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Posto Indígena (MHNCI); Rio da Divisa (MUHS); UHE-Segredo (FCS, BLR); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Cacicus chrysopterus Ihering & Ihering, 1907

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Concórdia (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Faxinal do Pedrão (Hinkelmann & Fiebig, 2001); UHE-Segredo (FCS, BLR); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Icterus cayennensis (Linnaeus, 1766)

merro

UHE-Segredo (FCS, BLR); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)

pássaro-preto

Vera Guarani (Chrostowski, 1912); Fazenda Firmiano (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001; FMNH); Fazenda Estância Nova, Posto Indígena, Foz do Rio dos Touros (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Alto da Serra da Esperança na margem da BR-373 (FCS, AUF); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC) ; Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Agelasticus thilius (Molina, 1782)

É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)

chupim-do-banhado

Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (FMNH); Foz do Rio Jordão (FCS); Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1886

UHE-Segredo (FCS, BLR) ; Faxinal do Céu (EC).

Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788)

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926); Estância Hidromineral Santa Clara, Rio Bonito/BR-466 (EC).

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)

chupim

Invernadinha (Sztolcman, 1926); Fazenda Iguaçu, Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); Cândido de Abreu (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Posto Indígena, Foz do Rio dos Touros, Foz do Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850)

polícia-inglesa

Fazenda Santa Clara (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS) ; Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis magellanica (Vieillot, 1805)

pintassilga

Solais (Straube, 1988); Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão, Foz do Rio da Areia (FCS); Palmeiral (RK) ; Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Arredores de Palmas, Estância Hidromineral Santa Clara (EC); Fazenda São Pedro (DK). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)

Faxinal do Céu, UHE-Foz do Areia, Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)

Foz do Rio da Areia (FCS)

Euphonia chalybea (Mikan, 1825)

bonito-lindo

Cândido de Abreu (Sztolcman, 1926; Hinkelmann & Fiebig, 2001); Foz do Rio dos Touros (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR); Estância Hidromineral Santa Clara (EC).

Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818)

Estância Hidromineral Santa Clara (EC)

Euphonia pectoralis (Latham, 1802)

Foz do Rio Jordão (FCS). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1882)

Fazenda Iguaçu (Straube, 1988); Rio da Divisa (MHNCI); UHE-Segredo (FCS, BLR).

FAMÍLIA PASSERIDAE

Passer domesticus Linnaeus, 1758

pardal, pardais

Rio Azul-Mallet (Pichorim & Bóçon, 1996); UHE-Segredo (FCS, BLR); Foz do Rio Jordão (FCS); Palmeiral (RK); Faxinal do Céu, Estância Hidromineral Santa Clara (EC). É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996).

B. COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Anodorhynchus glaucus (Vieillot, 1816). A informação, obtida por terceiros, de uma suposta arara-azul, ocorrente nas margens íngremes do "Rio Iguaçu" e correspondendo com as características de plumagem da espécie em questão (Straube, 1988), deve ser provisoriamente descartada, haja vista a carência de detalhes mais consistentes. A mesma posição deve ser aplicada a *Ara chloropterus*, pelos mesmos motivos.

Ara chloropterus Gray, 1859. Rio Iguaçu (Straube, 1988). *Vide* espécie anterior.

Chordeiles sp. Registro para "Rio Azul-Mallet" (Pichorim & Bóçon, 1996) não permite sequer especulações sobre a espécie a ser considerada.

Cypseloides sp. Registro para "Palmeiral" (RK) não permite opinião sobre a espécie a ser considerada, inclusive porque ambas as espécies confirmadas para o Paraná (Scherer-Neto & Straube, 1995) foram constatadas na área de estudo.

Ramphodon naevius (Dumont, ,1818). O exemplar único da espécie atribuído a uma coleta de Arkady Fiedler em "Cândido de Abreu" (Hinkelmann & Fiebig, 2001) merece reavaliação, podendo se tratar de erro de rotulagem. A espécie é, na maior parte de sua distribuição, privativa das terras baixas da Planície Litorâneas, situação que se repete nitidamente no Paraná, onde é bastante comum.

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839). As anotações de campo sobre essa espécie na área de estudo ("Fazenda Iguaçu", *apud* Straube, 1988) não foram suficientes para confirmá-la para a avifauna aqui analisada (FCS).

Geositta cunicularia (Vieillot, 1816). Citada para a região do planalto de Santa Catarina, nos "campos de Água-Doce" (Rosário, 1996), merece confirmação por questões óbvias, alusivas à sua distribuição geográfica e também quanto ao hábitat ocupado (EC).

Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831). Embora Sztolcman (1926) tenha identificado - provisoriamente - os espécimes provenientes de "Banhado", "Cará Pintada" e "Vermelho" como *Euscarthmus orbitatus* Wied, que corresponderiam modernamente ao *Hemitriccus orbitatus*, a questão merece reavaliação. Isso se deve à impossibilidade de identificação, com uso apenas das informações oferecidas por Sztolcman (1926), tal como suspeitado por Pinto (1944) ao cogitar a possibilidade de se tratar de um *H.margaritaceiventer*. Bem da verdade, o que corresponderia a *H.orbitatus* são os exemplares atribuídos por Sztolcman (1926) a *Euscarthmus striacicollis* (*sic*) *griseostriatus*, ficando dessa forma evidente que se tratam de táxons diferentes.

Elaenia sp. Por motivos óbvios, deve permanecer pendente qualquer posição sobre a identificação específica do registro obtido em "Rio Azul-Mallet" (Pichorim & Bóçon, 1996), bem como dos espécimes colecionados em "Reserva" e "Ribeirão Estreito" (MHNCI).

Myiarchus tyrannulus (Müller, 1776). Citada como coletada nas fazendas Firmiano (exemplar dessa localidade indicado como pertencente a um novo táxon: *M.t.czakii*) e Concórdia (*M.t.bahiae*) (Sztolcman, 1926). a identidade de tais espécimes merecem confirmação mediante reanálise dos exemplares depositados no Museu de Varsóvia, uma vez que nem mesmo Lanyon (1978:512) julgou-se apto a identificá-los, ainda que tenha sinonimizado (com dúvidas) o *M.t.czakii* em *M.s.swainsoni*.

Myiarchus sp. Registros para "Rio Azul-Mallet" (Pichorim & Bóçon, 1996) devem permanecer pendentes.

Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817) É citada para as adjacências do Estado de Santa Catarina (Rosário, 1996), mas a presença desta espécie na região merece confirmação, haja vista que todos os registros que pudemos compilar estão concentrados na zona da Serra do Mar e planície litorânea, ao menos no sul do Brasil (vide Ridgely & Tudor,

1989). Essa afirmação concorda, inclusive, com Belton (1985) para as áreas de ocorrência no Rio Grande do Sul.

AGRADECIMENTOS

Participaram nos trabalhos de campo: Alberto Urben-Filho, Bianca L.Reinert, Eduardo W. Patrial, Eloane R.Abade, Louri Klemann-Jr., Marcos R.Bornschein, Mauro Pichorim, Nicholas Kaminski, Raphael E.F. dos Santos e Valéria dos S.Moraes, aos quais expressamos nossa sincera gratidão pela colaboração em várias informações ornitológicas aqui apresentadas. Também auxiliaram nas questões logísticas: Vanessa G.Persson, Maria Lucia Lorini, J.Tadeu W.Motta, Fernando A.V.Zanella, Mônika Lustosa, Maria Carolina Vieira e Portes, Paulo Labiak, Renato Goldenberg e toda a equipe do aproveitamento e resgate da UHE-Segredo e Derivação do Rio Jordão; como técnicos de campo e taxidermistas colaboraram Francisco Cruz Neto, Luiz Fernando F.de Macedo, Valdenísio F.dos Santos e Sebastião C.Pereira.

Cederam informações inéditas bem como participaram em várias discussões: Valéria S.Moraes, Pedro Scherer-Neto, Douglas Kajiwara, Dante L.M.Teixeira, Aderlene de Lara, Dante Buzzetti, Roberto Bóçon, Silvana C.Luçolli, Sérgio D.Arruda, Celso Seger e principalmente Marcos A.G.Azevedo, que cedeu registros importantes de suas observações na região de Palmas/PR e Água Doce/SC.

José Afonso Motta e Maria Weidlich Motta proporcionaram uma acolhida hospitaleira em sua propriedade em Palmas; Edson Carrano e Mário Antônio Virmond Torres, ambos ex-funcionários da COPEL (Companhia Paranaense de Energia), abriram a oportunidade e obtiveram o devido financiamento para o trabalho em Faxinal do Céu.

Nosso sincero reconhecimento às entidades que possibilitaram a execução dos diversos programas deste estudo, desde a época do Relatório de Impacto Ambiental (1987) até a conclusão dos estudos para a Derivação do Rio Jordão (1996): Companhia Paranaense de Energia (COPEL), Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) e Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF/UFPR), particularmente em nome de Carlos Firkowski, o grande mentor dessa produtiva iniciativa.

Somos gratos também às instituições que, em parte, financiaram minhas pesquisas no Estado do Paraná, as quais, serviram para enriquecer o presente estudo: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza (FBPN) e Museu de História Natural Capão da Imbuia da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Este trabalho é dedicado ao biólogo **ROBERTO RIBAS LANGE** (1948-1993), passada mais de uma década desde seu falecimento, como justo reconhecimento à sua luta pela conservação da natureza paranaense em geral e do Rio Iguaçu em particular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ab´Saber, A.A. 1977. Os domínios morfoclimáticos da América do Sul: primeira aproximação. **Geomorf.52**.

Agostinho, A.A. & Gomes, L.C. 1997. **Reservatório de Segredo:** bases ecológicas para o manejo. Maringá, Universidade Estadual de Maringá/ NUPELIA e Companhia Paranaense de Energia. 387 pp.

Anjos, L.dos & Bóçon, R. 1992. Primeiros registros de *Biatas nigropectus* no Estado do Paraná. **I Congr. Bras. Ornit.**, Resumos R53.

Arruda, S.D.; R.Bóçon, R. & Seger, C.D.1995. Contributions towards the knowledge of the avifauna of the southern portion of Parana state, Brazil. **V Congr. Ornit. Neotrop.**, Resumenes R178.

Arruda, S.D. & Luçolli, S.C. 1991. Ocorrência de aves ameaçadas de extinção em General Carneiro, centro-sul do Estado do Paraná. **I Congr. Bras. Ornit.**, Resumos, p.38.

Arruda, S.D. & Péllico-Neto, S. 1990. A erva-mate *Ilex paraguariensis* St.Hil. Aquifoliaceae e as aves dispersoras de suas sementes, General Carneiro-PR. **VI Enc. Nac. Anilh. Aves**, Anais, p.54.

Belin, A.A.R.; Bazilio, S. & Cândido-Jr., J.F. 2003. Avifauna do Parque Municipal das Araucárias (Guarapuava, PR), com abordagem na fragmentação da floresta ombrófila mista. **XI Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos, FA09.

Bernardes, A.T.; Machado, A.B.M. & Rylands, A.B. 1990. **Fauna brasileira ameaçada de extinção.** Belo Horizonte, fundação Biodiversitas. 62 pp.

Bérnils, R.S. & Moura-Leite, J.C.de. 1990. A contribuição de André Mayer à História Natural no Paraná: III. Répteis. **Arq. Biol. Tecnol. 33**(2):469-480.

Bóçon, R. 1993. Observações sobre o ninho de *Leptasthenura setaria* (Temminck, 1824) no sul do Brasil. **Prim. Reun. Ornit. Cuenca del Plata**, Resumenes, p.7.

Bornschein, M.R.; Pichorim, M. & Reinert, B.L. 2001. Novos registros de *Scytalopus iraiensis*. **Nattereria 2**:29-33.

Camargo, H.F.de A. 1962. Sobre a viagem de Emil Kaempfer ao Brasil. **Pap. Avuls. Dep. Zool.15**:79-80.

CBRO - Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. 2005. **Lista das aves do Brasil**. Disponível on line, formato pdf, em URL: http://www.ib.usp.br/cbro. Acessada em 1º de fevereiro de 2005.

Chrostowski, T. 1912. Kolecja ornitologiczna ptaków paranskich. **Compt. Rend. Soc. Scient.Varsovie 5**:452-500.

Chrostowski, T. 1921. On some rare or little known species of south-american birds. **Ann. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat. 1**(1):31-40.

Cracraft, J. 1985. Historical biogeography and patterns of differentiation within the South american avifauna: areas of endemism. **Ornit.Monogr.36**:49-84.

Hinkelmann, C. e Fiebig, J. 2001. An early contribution to the avifauna of Paraná, Brazil. The Arkady Fiedler expedition of 1928/29. **Bulletin of the British Ornithologists' Club 121**(2):116-127.

IAPAR, 1978. **Cartas climáticas básicas do Estado do Paraná.** Curitiba, Instituto Agronômico do Paraná. 38 pp.

IUCN. 1993. **1994 IUCN Red List of Threatened Animals.** Cambridge, Inglaterra. IUCN-The World Conservation Union. 286 pp.

Jaczewski, T. 1925. The Polish Zoological Expedition to Brazil in the years 1921-1925. Itinerary and brief reports. **Ann. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat. 4**(4):326-351.

Krul, R. 1992. Avifauna de uma região de Cruz Machado, sul do Paraná. **II Congr. Bras. Ornit.**, Resumos R32.

Krul, R. & Moraes, V.dos S. 1994a. Composição e finalidades de agrupamentos heteroespecíficos de aves em ambientes naturais do Paraná e Santa Catarina. **II Congr. Ecol. Brasil**, Resumos II, p.447.

Krul, R. & Moraes, V.dos S. 1994b. Aspectos do sinantropismo em aves de zona rural no sul do Paraná. **II Congr. Ecol. Brasil**, Resumos II, p.492.

Lara, A.I. 1992. Registros de *Netta peposaca* e *N.erythrophthalma* para o estado do Paraná. **II Congresso Brasileiro de Ornitologia**, Resumos R52

Lorini, M.L. & Persson, V.G. 1990. A contribuição de André Mayer à História Natural no Paraná: II. Mamíferos do segundo planalto paranaense. **Arq. Biol. Tecnol. 33**(1):117-132.

Maack, R. 1981. **Geografia física do Estado do Paraná**. Rio de Janeiro, J.Olympio.

Mello-Leitão, C.de. 1946. As zonas de fauna da América tropical. **Rev. Bras. Geogr.8**:71-118.

Miranda, E.E. de & Coutinho, A.C. (coord.). 2004. **Brasil visto do espaço**. Campinas, Embrapa Monitoramento por Satélite, 2004. Disponível em URL: <http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br>. Acesso em 24 de setembro de 2004

Morato, S.A.A.; Bérnils, R.S. & Moura-Leite, J.C. 1993. Padrões de distribuição da fauna de répteis das Florestas com Araucária do sul do Brasil.**III Congr. Lat.-amer. Herpet.**, p.

Morato, S.A.A. 1995. **Padrões de Distribuição da Fauna de Serpentes da Floresta de Araucária e Ecossistemas Associados na Região Sul do Brasil**. Curitiba, Universidade Federal do Paraná, Departamento de Zoologia, Dissertação de mestrado. 122 pp.

Naumburg, E.M.B. 1935. 1935. Gazetteer and maps showing stations visited by Emil Kaempfer in eastern Brazil and Paraguay. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 68**(6):449-470.

Naumburg, E.M.B. 1937. Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer: Conopophagidae, Rhinocryptidae, Formicariidae (part). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 74**(3):139-205.

Naumburg, E.M.B. 1940. Studies of birds from eastern Brazil and Paraguay, based on a collection made by Emil Kaempfer: Formicariidae (part). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 76(**6):231-276.

Pacheco, J.F. & Whitney, B.M. 2001. Um tributo ao naturalista Friedrich Sellow (1789-1831). *In*: F.C.Straube ed. **Ornitologia sem fronteiras**. Curitiba, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. p. 33-41.

PARANÁ, 1987. **Atlas do estado do Paraná**. Curitiba, Instituto de Terras, Cartografia e Florestas. 73 pp.

Pichorim, M. & Bóçon, R. 1993. Avifauna de Rio Azul e Mallet, sul do Estado do Paraná. **III Congr. Bras. Ornit.**, Resumos R22.

Pichorim, M. & Bóçon, R. 1996. Estudo da composição avifaunística dos municípios de Rio Azul e Mallet, Paraná, Brasil. **Acta Biol. Leopoldensia 18**(1):129-144.

Pinto, O.M.de O. 1944. **Catálogo das aves do Brasil**. 2ºparte. São Paulo, Depart. Zool., Secret.Agric.Ind.Com. 700 p.

Raposo, M.A. 1997. A new species of *Arremon* (Passeriformes: Emberizidae) from Brazil. **Ararajuba** 5(1):3-9.

Raposo, M. & Teixeira, D.M. 1992. Revalidação de *Chamaeza meruloides* Vigors, 1825 (Aves, Formicariidae). **Bol. Mus. Nac.**, nova série **350**:1-11.

Rosário, L.A. do. 1996. **As aves em Santa Catarina**: distribuição geográfica e meio-ambiente. Florianópolis, FATMA. 326

Scherer-Neto, P. & Straube, F.C. 1995. **Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia.** Campo Largo, Logos Press. 79 pp.

Sick, H. 1997. **Ornitologia brasileira**. Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 862 p.

Straube, F.C. 1988. Contribuição ao conhecimento da avifauna da região sudoeste do Estado do Paraná. **Biotemas 1**(1):63-75.

Straube, F.C. 1993. Tadeusz Chrostowski, pai da Ornitologia no Paraná. **Atual. Ornit. 52**, p.3.

Straube, F.C. 1995. Aves ameaçadas de extinção no Paraná. *In*: M.P.G. TOSSULINO *et al.* eds. **Lista Vermelha de animais ameaçados de extinção no Estado do Paraná.** Curitiba, IAP/GTZ. 175 pp.

Straube, F.C. & Arruda, S.D. 1991. Coletânea da avifauna da porção sul do Estado do Paraná. **I Congr. Bras. Ornit.**, Resumos p.21.

Straube, F.C. & Bornschein, M.R. 1989. A contribuição de André Mayer à História Natural no Paraná. I. Sobre uma coleção de aves do extremo noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. **Arq. Biol. Tecnol. 32**(2):441-471.

Straube, F.C. & Reinert, B.L. 1993. Avifauna da Usina Hidrelétrica de Segredo (sudoeste do Paraná) e a influência atlântica nas florestas com araucária. **III Congr. Bras. Ornit.**, Resumos P69.

Straube, F.C. & Scherer-Neto, P. 2001. História da Ornitologia no Paraná. *In*: F.C.Straube ed. **Ornitologia sem fronteiras**. Curitiba, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. p. 43-116.

Straube, F.C. & Urben-Filho, A. 2001. Análise do conhecimento ornitológico da região noroeste do Paraná e áreas adjacentes. *In*: J.L.Albuquerque, J.F.Cândido-Jr., F.C.Straube e A.Roos eds. **Ornitologia e conservação: da ciência às estratégias**. Florianópolis, Sociedade Brasileira de Ornitologia, Unisul e CNPq.

Straube, F.C. & Urben-Filho, A. 2002a. Tadeusz Chrostowski (1878-1923): biografia e perfil do patrono da Ornitologia paranaense. **Bol. Inst. Hist. Geogr. Paraná 52**:35-52.

Straube, F.C. & Urben-Filho, A. 2002b. A contribuição das expedições zoológicas polonesas (1910-1924) para a História Natural no Paraná. **Bol. Inst. Hist. Geogr. Paraná 52**:53-82.

Straube, F.C.; Urben-Filho, A. & Kajiwara, D. 2005. Aves. *In*: S.B.Mikich & R.S.Bérnils. **Livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná**. Curitiba, IAP. p.143-496

Sztolcman, J. 1926. Étude des collections ornithologiques de Paraná. **Ann. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat. 5**(1):107-196.

Traylor, M.A. 1979. Tyrannidae. In: M.A.Traylor ed. **Check-list of birds of the world**: a continuation of the work of James L.Peters. Cambridge, Museum of Comparative Zoology. 365 pp.

Urben-Filho, A.; Straube, F.C. & Gatto, C.A.F.R. 2001. Primeiro registro de *Chamaeza meruloides* para o Paraná. *In*: F.C.Straube ed. **Ornitologia sem fronteiras**, incluindo os Resumos do IX Congresso Brasileiro de Ornitologia (Curitiba, 22-27 de julho de 2001). Curitiba, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. R2174, p. 381-382.

Vanzolini, P.E. 1996. A contribuição zoológica dos primeiros naturalistas viajantes no Brasil. **Rev.USP 30**:190-238.

Veloso, H.P.; Rangel-Filho, A.L.R.R. & Lima, J.C.A.1991. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal**. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE. 123 pp.

Wachowicz, R.C. 1994. Tadeusz Chrostowski, um naturalista polono-paranaense. **Rev. Acad. Paran. Letras 32**:188-202.

Willis, E.O. 1992. Three *Chamaeza* antthrushes in eastern Brazil (Formicariidae). **Condor 94**(1):110-116.

Wosiacki, W.B. 1990. A contribuição de André Mayer à História Natural no Paraná. IV. Peixes. **Arq. Biol. Tecnol. 33**(4):853-862.

ANEXO 1

Notas toponímicas das estações de inventário ornitológico na região sul do Paraná, com indicação de coordenadas geográficas e altitudes aproximadas. Acrônimos de observadores encontram-se no ítem Material e Métodos. Datas referentes aos trabalhos de campo são oferecidas apenas de estudos inéditos dos autores; aos demais, remete-se o nome completo do coletor ou autor do registro à publicação original e/ou à coleção ornitológica onde o material está depositado.

15 km NE da foz do rio Jordão (25º42'S e 52º00'W; alt.: 960 m): Exemplares coletados por Aderlene de Lara, Roberto Bóçon e Celso D.Seger (MHNCI), alusivos aos estudos de impacto ambiental da Derivação do rio Jordão. Esse ponto de coleta situa-se entre as já submersas cachoeira da Vaca Branca e foz do rio Capão Grande. Nesse sentido, cabe ressaltar que a dita cachoeira da Vaca Branca situa-se a montante de outra queda d'água, denominada cachoeira da Tia Chica (ou Nhá Chica) e não o contrário, tal como apresentado em diversas cartas geográficas, inclusive do exército brasileiro.

Alto da Serra da Esperança (25º20'S e 51º15'W; alt.: 500 a 1000 m): FCS e AUF (10 de abril de 2003). A localidade situa-se às margens da BR-373, no trecho Prudentópolis-Guarapuava.

Apucarana (24º40'S e 51º10'W; alt.: 450 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926), Edwin Steiger (exemplares no FMNH; *vide* Straube & Scherer-Neto, 2001). Essa localidade, atualmente denominada "Três Bicos", não deve ser confundida com a cidade homônima, situada nos arredores de Londrina.

Arredores de Palmas (26º30'S e 52º00'W; alt. 1160 m): EC (2-6 de julho de 2002) Nota: Foram vistadas várias localidades nos arredores desta cidade, ao longo da BR-280, na área de influência da Usina Eólica de Palmas.

Banhado (25º25'S e 51º25'W; alt.: 1145 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Barra Bonita (25º02'S e 51º00'W; alt.: 820 m): FCS e AUF (11 de abril de 2003).

Barra do rio Iguaçu em Laranjeiras do Sul (ca. 25º43'S e 52º30): exemplar no MHNCI.

Cândido de Abreu (24º33'S e 5120'W; alt. 467 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Arkady Fiedler e Anthoni Wisniewski (Hinkelmann & Fiebig, 2001); Edwin Steiger (exemplares no FMNH, *vide* Straube & Scherer-Neto, 2001).

Cará Pintada (25º10'S e 51º30'W; alt. 1007 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Chapéu de Sol (26º10'S e 50º45'W; alt. 700 m): Tadeusz Chrostowski (Chrostowski, 1911).

Covó (25º35'S e 26º07'W; alt: 900 m): FCS e BLR (MHNCI): exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS. Essa localidade situa-se às margens do rio Marrecas.

Estância Hidromineral Santa Clara (25º38'S e 51º58'W; alt. 1050 m): EC (28-30 de agosto de 2003; 5-9 de novembro de 2003; 11-15 de dezembro de 2003; 8-11 de janeiro de 2004; 27-30 de dezembro de 2004; 13-15 de janeiro de 2005; 1-4 de fevereiro de 2005). Esse topônimo é sinônimo de Fazenda Santa Clara (*q.v.*), desapropriada nos anos 90 para a construção de reservatório para aproveitamento hidrelétrico.

Faxinal do Céu (25º55'S e 51º35'W; alt.: 800 m): EC (13-28 de fevereiro de 1997; 15-25 de maio

Faxinal do Pedrão (24º56'S e 51º20'W; alt.: 600 m): Arkady Fiedler (Hinkelmann & Fiebig, 2001). A tentativa de retificação da localidade "Fachinal de Pedrão" para "Faxinal da Boa Vista" (Hinkelmann & Fiebig, 2001), não foi aqui acatada por desconhecer os motivos e a precisão geográfica para tanto, forçando-nos a preferir o nome original até que a questão seja esclarecida. Também as coordenadas geográficas e altitude devem ser consideradas passíveis de verificação, pelos mesmos motivos. Por questões de padronização, adotamos aqui apenas a correção do topônimo em adoção à regras de ortografia da língua portuguesa (portanto Faxinal do Pedrão).

Fazenda Concórdia (25º45'S e 51º05'W; alt. 1135 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Fazenda Durski (25º35'S e 51º20'W; alt. 996 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Fazenda Estância Nova (não localizado): Andreas Mayer (MHNCI). Consta situar-se nos arredores da cidade de Palmas.

Fazenda Ferreira (25º35'S e 51º15'W; alt.: 947 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Fazenda Firmiano (25º40'S e 51º10'W; alt. 938 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Fazenda Iguaçu (25º55'S e 52º10'W; alt. 530 m): Straube (1988); FCS e BLR (MHNCI). Essa propriedade situa-se na foz do rio Verde e foi visitada quando da preparação do relatório de impacto ambiental da UHE-Segredo e, posteriormente, durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo".

Fazenda Pitanga (não localizado): BLR (MHNCI). Situa-se nos arredores da cidade de Palmas.

Fazenda Santa Clara (25º38'S e 51º55'W; alt. 1050 m): FCS e BLR (MHNCI).

Fazenda Santa Júlia (não localizado): Andreas Mayer (MHNCI). Situa-se no município de Palmas.

Fazenda São Geraldo (26º14'S e 52º00'W; alt. 800-1000 m): FCS (15-18 de junho de 1985).

Fazenda São Jerônimo (não localizado): Andreas Mayer (MHNCI). Situa-se no município de Palmas.

Fazenda São Pedro (26º22'S e 51º22'W; alt. 990 m): DK (julho a dezembro de 2002).

Fazenda Três Capões (25º25'S e 51º40'W; alt. 1120 m): exemplar no MHNCI. Essa fazenda era propriedade do geógrafo Reinhardt Maack (*vide* Maack, 1981).

Foz do rio Bragança (25º52'S e 52º10'W; alt.: 524 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS.

Foz do rio Butiá (25º55'S e 52º05'W; alt:. 531 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS.

Foz do rio Capoteiro (25º52'S e 52º10'W; alt.: 518 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS.

Foz do rio da Areia (25º50'S e 51º15'W; alt. 800-1000 m.): FCS e AUF (30-31 de agosto de 2001).

Foz do rio da Divisa (25º48'S e 52º08'W; alt.: 501 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS.

Foz do rio dos Touros (25º55'S e 52º05'W; alt.: 528 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS.

Foz do rio Iratim (26º03'S e 52º00'W; alt.: 561 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS.

Foz do rio Jordão (25º45'S e 52º15'W; alt. 600-800 m): FCS (14 a 21 de fevereiro de 1996; 1º a 3 de março de 1996; 24 abril a 4 maio de 1996; 7 a 9 de junho de 1996; 28 a 30 de junho de 1996; 26 a 28 de julho de 1996; 9 a 11 de agosto de 1996; 30 de agosto a 1º de setembro de 1996; 20 a 22 de setembro de 1996; 19 a 21 de outubro de 1996).

Foz do rio Vila Nova (25º52'S e 52º12'W; alt. 530 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS. Essa localidade é sinônima de "foz do rio Portão", assim grafada em alguns rótulos.

Fuck (25º48'S e 51º05'W; alt. 1000 m): RK e VSM (*vide* sob Palmeiral).

Guarapuava (25º23'S e 51º27'W; alt.:1120 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926); Pedro Scherer-Neto (Scherer-Neto & Straube, 1995).

Invernadinha (25º15'S e 51º25'W; alt. 1065 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Laranjeiras do Sul (não localizado): exemplar no MHNCI.

Mallet (25º50'S e 50º50'W; alt. 939 m): Tadeusz Chrostowski (Chrostowski, 1911; Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926). *Vide* sob Rio Azul-Mallet.

Margem do rio Ivaí em Prudentópolis (24º58'S e 51º10'W; alt:.450 m): FCS e AUF (11 abril de 2003). Nota: localidade situada nas proximidades da foz do rio dos Índios.

Marumbi (25º40'S e 50º50'W; alt.: 780 m): exemplares no MHNCI.

Palmas (26º30'S e 52º00'W; alt. 1160 m): Andreas Mayer (MHNCI). Há também a menção a uma *Harpia harpyja* coletada nesse topônimo (*vide* Pinto, 1938) e depositada no Museu de Zoologia da USP.

Palmeiral (25º47'S e 51º07'W; alt.1100 m): RK e VSM (5 a 7 de abril de 1991; 25 a 27 de junho de 1991; 5 a 7 de agosto de 1991; 22 a 24 de dezembro de 1991; 14 a

16 de fevereiro de 1992; 9 a 11 de abril de 1992; 12 a 14 de setembro de 1992; 26 a 28 de novembro de 1992; 23 a 25 de abril de 1993; 10 a 12 de agosto de 1993; 13 a 15 de novembro de 1993; 26 a 27 de dezembro de 1993; 15 a 17 de janeiro de 1994; 25 a 27 de março de 1994; 26 a 28 de maio de 1994; 27 a 29 de julho de 1994; 7 a 9 de setembro de 1994).

Papuã (25º55'S e 51º08'W; alt. 1000 m): RK e VSM (*vide* sob Palmeiral)

Parque Municipal das Araucárias (25º23'S e 51º27'W; alt.:1120 m): Belin *et al*. (2003).

Pedregulho (26º10'S e 52º40'W; alt. 600 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI.

Pinhão (não localizado): Andreas Mayer (MHNCI).

Posto Indígena (não localizado): Andreas Mayer (MHNCI). Situa-se nos arredores da cidade de Palmas.

Procopiak (25º45'S e 51º05'W; alt. 1135 m): RK e VSM (*vide* sob Palmeiral)

Reserva (25º50'S e 52º02'W; alt. 980 m): exemplar no MHNCI. A denominação Reserva (assim citada nos mapas oficiais) é sinônimo de Rondinha (assim denominada pelos moradores locais), lugarejo às margens do rio Bragança e atualmente sede do município modernamente denominado Reserva do Iguaçu.

Reserva do Iguaçu (25º50'S e 52º02'W; alt. 980 m): FCS e BLR (MHNCI). Sinônimo da Reserva (*q.v.*)

Reserva rio dos Touros (25º55'S e 52º05'W; alt.: 528 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS. Essa área, antigamente protegida pela empresa Fiat Lux (depois *Swedish Match*), é contígua à atualmente denominada Estação Ecológica do rio dos Touros, sob tutela do governo estadual do Paraná. *Vide* sob foz do rio dos Touros.

Ribeirão da Divisa (25º50'S e 52º02'W; alt. 980 m): FCS e BLR (MHNCI). Localidade situada nas adjacências de Reserva (*q.v.*), sinônima de rio da Divisa.

Ribeirão Estreito (25º46'S e 52º08'W; alt. 950 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS. Trata-se de um pequeno córrego situado na margem esquerda da estrada que dá acesso à vila de Segredo.

Rio Azul-Mallet (não localizados): Pichorim & Bóçon (1996). *Vide* sob Mallet. Esses dois topônimos foram amplamente citados sem discriminação de registros.

Rio Bonito/BR-466 (24º58'S e 51º32'W): EC (setembro e dezembro de 1999; junho de 2000). Nota: a localidade fica entre os municípios de Turvo e Boa Ventura de São Roque. Datas de visita não anotadas.

Rio Bragança (25º50'S e 52º02'W; alt. 980 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS.

Rio Claro (25º45'S e 50º55'W; alt. 992 m): Tadeusz Chrostowski (Chrostowski, 1911). Esse topônimo não deve ser confundido com o homônimo citado por Jaczewski (1925 e Sztolcman, 1926).

Rio da Divisa (25º50'S e 52º02'W; alt. 980 m): FCS e BLR: exemplares coletados durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de

Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo", depositados no MHNCI, MN e/ou MUHS.

Rio Iguaçu (não localizado): Topônimo não localizado, baseado em informações de terceiros, mas certamente situado dentro dos limites da área de estudo (*vide* Straube, 1988).

Rio Jordão, Guarapuava (25º25'S e 51º25'W; 1005 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Rio Ubazinho (24º35'S e 51º20'W; alt: 460 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Rio Xagu (25º28'S e 52º30'W): Exemplar no MHNCI. Nota: Referente a um indivíduo de *Coccyzus melacoryphus* coletado atropelado a poucos metros da ponte sobre o rio Xagu, na rodovia BR-277.

Rondinha/Paula Freitas (26º10'S e 50º50'W; alt. 750 m): exemplares no MHNCI. Não confudir com rondinha, antiga denominação da localidade de Reserva (*q.v.*), atualmente sede do município de Reserva do Iguaçu.

Salto de Ubá (24º30'S e 51º25'W; alt.: 414 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Santa Bárbara, rio Jararaca (26º12'S e 51º30'W): Andreas Mayer (MHNCI). Para fins de padronização, por ser localidade não precisamente localizada, sugere-se que coincida com o lugarejo denominado Jararaca, pertencente ao município de Bituruna.

Santa Cruz (26º10'S e 50º25'W; alt: 900 m): Tadeusz Chrostowski (Chrostowski, 1911).

Solais (26º02'S e 51º58'W; alt.: 540 m): Straube (1988: longitude errônea, *q.v.*). Nota adicional: os trabalhos referentes a essa publicação foram realizados nas proximidades da foz do rio Solais. Persson & Lorini (1990) citam a mesma localidade como "Empresa"; preferimos, porém, o topônimo mais conhecido em cartas geográficas oficiais.

Teresina (24º45'S e 51º05'W; alt. 445 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

UHE-Foz do Areia em Bituruna (26º05'S e 51º35'W; alt.: 900 m): EC (21-22 de fevereiro de 1997; 18-19 de julho de 1997).

UHE-Segredo (25º50'S e 52º55'W a 26º00'S e 51º45'W; alt.: 560-1100 m): FCS e BLR (22 a 27 de outubro de 1991; 19 a 25 de novembro de 1991; 13 a 18 de janeiro de 1992; 23 a 27 de fevereiro de 1992; 7 a 12 de abril de 1992; 12 a 16 de maio de 1992; 16 a 20 de junho de 1992; 3 a 26 de julho de 1992). Todos os registros foram obtidos durante o "Aproveitamento faunístico e florístico da Usina Hidrelétrica de Segredo" e o "Resgate de fauna da UHE-Segredo".

Vera Guarani (26º05'S e 50º40'W; alt.: 800 m): Tadeusz Chrostowski (Chrostowski, 1911).

Vermelho (24º55'S e 51º25'W; alt: 935 m): Tadeusz Chrostowski (Jaczewski, 1925; Sztolcman, 1926).

Vila de Segredo (25º46'S e 52º08'W; alt. 950 m): exemplares no MHNCI. Vide sob ribeirão Estreito.